好膚寧 乳膏
P.D.S. cream

衛部藥製字第058276號
GMP G-12286

成　　分：Each GM Contains:
Diphenhydramine HCl..... 10mg
Prednisolone..... 1mg
Sulfanilamide..... 50mg

賦 形 劑：Stearyl Alcohol、Propylene Glycol、Tween 60、Beeswax White、Paraffin Wax、Glyceryl Monostearate、Lanolin Anhydrous、Propylparaben、Cetyl Isooctanoate、Isopropyl Myristate、Liquid Paraffin、Methylparaben、Jasmine Oil、Water Purified

適 應 症：過敏性濕疹、感染性皮膚炎、糜爛性皮膚炎、接觸性皮膚炎、小兒濕疹、神經性皮膚炎、凍傷、蕁麻疹、藥物性皮膚炎。

用法用量：醫師藥師藥劑生指示藥品。
以乾淨棉花棒，輕塗於感染皮膚，一日三次。

副 作 用：類固醇：

(A)局部性：搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張。

(B)全身性：庫欣式症候群(Cushing's syndrome，如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)、繼發性腎上腺功能不足(secondary adrenal insufficiency，如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

注意事項：

1.須置於小孩接觸不到之處。
2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
5.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
6.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
7.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
8.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
9.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
10.深部皮膚組織感染請就醫治療。
11.除非藥師、藥劑生或醫師指示，類固醇抗發炎劑不可連續使用超過二星期。
12.對皮膚類固醇過敏者，請勿使用。
13.本品不可用於病毒性皮膚炎（疱疹、水痘、牛痘）或結核性損傷，亦不可用於眼部。

警　　語：類固醇：

1.對藥物各成分過敏者不得使用。
2.小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
3.癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
4.臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
5.皮膚的黴菌感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

貯　　存：置於避光、防潮、陰涼、室溫(15-30°C)保存。
包　　裝：1000公克以下軟管、罐裝。

羅得化學製藥股份有限公司
台中市大甲區東西七路一段65號