

# "永勝"胃納錠 500 毫克(氨基酯醯羥鋁)

Wina Tablets 500mg "EVEREST" (Dihydroxyaluminum aminoacetate)

【成分】：每錠含有

Dihydroxyaluminum aminoacetate.....500mg

單次劑量(1 錠)之酸中和能力為 7.4mEq

【作用】

Dihydroxyaluminum aminoacetate 中和胃酸，減緩不適。

【適應症】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【用法·用量】

一天 3 至 4 次，或需要時服用，應嚼碎後吞服。12 歲以上，適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，適用成人劑量之 1/2；3 歲以上未滿 6 歲，適用成人劑量 1/4；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示使用。

【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警語】

(一) 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

1. 未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
2. 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
3. 制酸劑不得併用其他藥品。

(二) 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。

(三) 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。

(四) 本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。

(五) 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症 (Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變 (Dialysis encephalopathy) 及低磷血症，應謹慎小心使用。

【賦形劑】 Corn Starch、Sodium Saccharin、Strawberry Essence、Peppermint Oil、Sodium Starch Glycolate、Silicon Dioxide、Magnesium Stearate、Erythrosin。

【儲存條件】 25°C 以下、遮光處、密封保存。

【包裝】：6~1000 錠塑膠瓶、PTP 盒裝。

衛部藥製字第 058379 號



嘉義頭橋工業區工業三路 6-3 號  
諮詢電話：05-2218686 (代表號)