

鎮咳祛痰劑

百咳寧膠囊

Biconin Capsules

【成分】有效成分及含量 Each capsule contains:

Dextromethorphan Hydrobromide.....	20mg
dl-Methylephedrine Hydrochloride.....	25mg
Noscapine.....	20mg
Potassium guaiacolsulfonate	90mg
Carbinoxamine maleate.....	4mg

其他成分(賦形劑):

Microcrystalline Cellulose、Magnesium Stearate、Capsule(Gelatin、Purified Water、Glycerin、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、Erythrosine、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide)。

【用途(適應症)】

緩解感冒之各種症狀(鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、咳嗽、喀痰)。

使用上【注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用:

1. 曾經因本藥成分引起過敏的人。
2. 服用丹胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(SSRI)的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治:

1. 6 歲以下
2. 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
3. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如:慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
4. 有呼吸疾病的人:如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難、及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
5. 有心臟病及 65 歲以上的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 正在服用其他綜合感冒藥、止咳化痰、鼻炎藥或、抗過敏藥、止痛或退燒等藥品。
3. 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項:

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量。
4. 不要服用本藥超過七日。
5. 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
6. 不得與酒精飲料併服。

【用法用量】

成人及 12 歲以上	一次 3 次，一次一粒。
9 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2
6 歲以上未滿 9 歲	適用成人劑量之 1/3
6 歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑師:

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治:

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- (三) 症狀沒有改善、或症狀還有併隨有發燒、或發燒持續三日。
- (四) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

【包裝、儲存】

- 6-1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。
- 25°C 以下密封、避光、避熱、避濕儲存。

【類別】:醫師藥師藥劑生指示藥品。