

康緒神 膜衣錠 200 毫克

Calm-up F.C. Tablets 200 mg

【成分】

Each F.C. Tablet contains :
Sulpiride 200 mg

【賦形劑】

L-H.P.C、LACTOSE、COMPRITOL 888 ATO (GLYCERYL BEHENATE)、MAGNESIUM STEARATE、HPMC、P.E.G.6000、TITANIUM DIOXIDE

【臨床藥理】

- 1.本品具有強力的抗 Dopamine 作用，強力抑制 Apomorphine 或 Meta-Amphetamine 等之 Dopamine 樣刺激作用。
- 2.本品亦具有潰瘍癒合作用，能抑制下視丘後部以電氣刺激造成的胃粘膜血流的停滯而產生部分之貧血現象。

【適應症】

精神病狀態、消化性潰瘍。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用

精神分裂病：

通常成人1日 300-600 mg，分次口服。但可以依年齡、症狀做適宜的增減。每日最高劑量為 1200 mg。

憂鬱病、憂鬱狀態：

通常成人 1 日 150-300 mg，分次口服。但可以依年齡、症狀做適宜的增減。每日最高劑量為 600 mg。

胃、十二指腸潰瘍：通常成人一日 150 mg，分 3 次口服，並依病情酌量增減。

【注意事項】

一、胃、十二指腸潰瘍時：

1.一般注意事項：

給與本劑可能會出現間腦之內分泌機能調節異常，錐體外徑症狀等的副作用，所以，給與本劑時，須充分考慮其有效性與安全後使用。

2.下列患者請勿給藥

疑似有嗜鉻細胞瘤之患者(有引起血壓急劇上升之虞)

3.下列患者應慎重給藥

(1)小兒(易出現錐體外徑症狀，故須注意給藥，不可過量)。

(2)老年人。

4.對孕婦的給藥

有關懷孕中給藥的安全性尚未確立，所以，在孕婦或可能已懷孕的婦女，限於判斷其治療上的有益性超越危險性時，才可給藥。

5.對授乳婦的給藥

對新生兒之安全性尚未確立，所以，在授乳期間的婦女，限於判斷其治療上的有益性超越危險性時，才可給藥。

6.其他：

(1)對於正在給與本劑之患者，須注意勿使其從事開車等伴有危險性的機械操作。

(2)因有止吐作用，所以可能會使腸阻塞，腦瘤等引起的嘔吐症狀變得不明顯，故須嚴密觀察，慎重給藥。

二、精神分裂病時：

1.下列患者請勿給藥：

疑似有嗜鉻細胞瘤之患者(有引起血壓急劇上升之虞)

2.下列患者應慎重給藥：

(1)有或疑似有心、血管疾病、低血壓之患者。

(2)有腎病變之患者。

(3)高齡者

3.對孕婦的給藥：

有關本劑之懷孕中給藥的安全性尚未確立，所以，在孕婦或可能已懷孕婦女，限於判斷其治療上的有益性超越危險性時，才可給藥。

4.對授乳婦的給藥：

本劑對於新生兒的安全性尚未確立，所以，在授乳期間的婦女，限於判斷其治療上的有益性超越危險時才可給藥。

5.對幼小兒的給藥：

本劑對於幼小兒的安全性尚未確立，故請勿給藥。

6.其他：

(1)本劑有止吐作用，所以可能會使因其他藥劑導致的中毒，腸阻塞，腦瘤等引起的嘔吐症狀變得不明顯。

(2)對於正在給與本劑的患者，須注意勿使其從事開車等伴有危險性的機械操作。

【交互作用】

1.與抗膽鹼性藥(Atropine, Methyl Scopolamine 等)有藥理學性的拮抗作用，合併使用時有可能減弱抗膽鹼性藥物之作用，故須避免與抗膽鹼性藥併用。

2.本劑可能會使成為 Digitalis 飽和時的指標如噁心、嘔吐食慾不振症狀變得不明顯，所以在接受 Digitalis 劑給藥患者，須嚴密觀察，慎重給藥。

【副作用】

一、胃、十二指腸潰瘍時：