有效成分及含量

Each ml contains
Chlorhexidine Gluconate.....5.0mg

其他成分(賦形劑)

Citric Acid anhydrous、Allantoin、 Diisobutyl Adipate、
Isopropyl Alcohol、D.I.Water

用途(適應症)

緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等導致皮外之傷口及
傷口周圍的洗淨、消毒、殺菌來防止傷口的感染。

不得使用族群

曾因本藥成分引起過敏者。

用法用量

一日數次，撒佈或噴灑於患部，或以紗布、脫脂棉等沾取塗抹。

類別

醫師藥師藥劑生指示藥品

諮詢專線



危險

主要危害成份 ： Isopropyl alcohol 70% (v/v)
異丙醇

危害警告訊息 ：
高度易燃液體和蒸氣
吞食可能有害
造成輕微皮膚刺激
造成眼睛刺激

危害防範措施 ：
置容器於通風良好地方
遠離引燃品-禁止抽菸
避免與眼睛接觸
勿倒入排水溝
防止靜電

※更詳細的資料，請參考安全資料表



【儲存】25˚C 以下陰涼乾燥處儲存。
【批號/製造日期/保存期限】
請見盒身標示

衛部藥製字第 058833 號
容 量：1000 ml
產 地：台灣
本品僅供外用，請勿觸及眼耳鼻口

委託製造者：冠亨生技股份有限公司
地址：新北市汐止區環河街 88 巷 3 弄
5 號 2 樓

製造廠：PIC/S GMP 藥廠
歐帕生技醫藥股份有限公司
AUPA Biopharm Co.Ltd.
廠址：新竹縣湖口鄉光復路 1 號

經銷商：尚典生技股份有限公司
台北市南港區園區街 3 號 16 樓之 5
服務電話：0800-800-196



外用

使得潔淨殺菌液 0.5% 克羅希西定)

Sterigiene Solution 0.5% Chlorhexidine)