

11*25.4公分

單劑量包裝 一次使用一支

眼亮佳 眼藥水0.5%
Beter-free Eye Drops 0.5% (Tropicamide)

單劑量包裝使用 • 不產生交互感染 • 不含防腐劑

【優點】

- (1)於滴後約20~25分鐘，即可達到最大之散瞳及睫狀肌麻痺作用，可保持效果約15分鐘，如欲維持睫狀肌麻痺作用時，於20~30分鐘後，可再滴一滴。
- (2)恢復快，可使患者很快離開醫師診室，於2~4小時內，可恢復眼之調節功能，通常於6小時內可完全恢復，無需藉助縮瞳劑，如應用縮瞳劑時，則恢復更快。
- (3)本品不論虹膜之顏色如何都有效。
- (4)為特殊不同目的，有二種濃度之選擇：0.5%係為散瞳作用（具有適度短效睫狀肌麻痺作用），1%為希望最大睫狀肌麻痺效果時應用之。

【成分】

Each ml contains :

Tropicamide5mg

賦形劑 : E.D.T.A-2Na, Hydrochloric Acid, Sodium Chloride,
Distilled Water

【適應症】

散瞳及睫狀肌麻痺。

【用法·用量】

本藥限由醫師使用。

用於檢查眼底—於檢查前15~20分鐘，將0.5%藥水滴入一滴或二滴即可。

【禁忌】

勿用於房角狹窄性青光眼 (narrow angle glaucoma) 。

【注意】

- 1.與任何其他之散瞳劑同，當眼壓增高或眼壓不明或眼內房淺時用時宜注意。於驗光（屈光），需要睫狀肌麻醉作用延長時，只需要另外附加一滴即可。
- 2.本藥為可回蓋式(re-cap)不含防腐劑拋棄式小包裝眼藥水，需於24小時內使用完畢。

【副作用】

有時可能發生暫時性刺痛感覺。

【儲存】

請儲存於25°C以下，並避免陽光及日光燈直射，不要置於高溫環境或冰箱中，瓶蓋宜蓋緊。
須置於小孩接觸不到之處。

【包裝】

0.5毫升，單一劑量塑膠瓶裝。

衛部藥製字第 059053 號



麥迪森企業股份有限公司

公 司：臺北市中正區林森南路10號5樓
桃園廠：桃園市桃園區桃鶯路445-2號1樓