

“汎宇”

# 樂悠錠

## Rayor Tablets "Cosmic"

衛部藥製字第 059054 號  
GMP G-12720

【成份】：

每錠含有 Dihydroergotamine mesylate 1mg

賦形劑：Lactose, Cellulose microcrystalline, Sodium starch glycolate, Silicon dioxide, Magnesium stearate

【描述】：


一般名：Dihydroergotamine Mesilate (日文：メシル酸ジヒドロエルゴタミン)

化學名：(5'S)-5'-Benzyl-9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methylelrgotaman-3',6',18-trione monomethanesulfonate

分子式：C<sub>33</sub>H<sub>37</sub>N<sub>5</sub>O<sub>5</sub> · CH<sub>3</sub>O<sub>3</sub>S

分子量：679.79

化學式：



性狀：

本藥為白色～帶黃白色或灰白色～帶紅白色的粉末。易溶於冰醋酸，稍不溶於甲醇(methanol)或氯仿(chloroform)，難溶於水及乙醇(ethanol)，不溶於無水醋酸或二乙醚(diethyl ether)。

本藥遇光慢慢變色。

融點：約 214°C (分解)。

pH：0.05g 的本藥溶於 50 ml 的水，其 pH 值為 4.4～5.4。

【適應症】：

偏頭痛。

【用法用量】：

通常成人一天三次，每次口服 1 mg (1 錠)。並可依年齡、症狀做適宜增減。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

1. 禁忌：

- (1) 對本藥或麥角鹼過敏病史的患者。
- (2) 末梢血管障礙、閉塞性血管障礙、狹心症、冠狀動脈硬化患者。(因為血管收縮作用會使這些疾病惡化)
- (3) Ritonavir、Nelfinavir 投與中的患者。

2. 慎重投與：

肝或腎機能障礙者(會延遲代謝或排除)。

3. 交互作用：

(1) 不可併用：

本藥與 Ritonavir、Nelfinavir 併用，會使本藥的血中濃度大幅上升，造成血管攣縮的重度副作用。

(2) 併用時須注意：

Macrolides 類抗生素(如 Erythromycin 等)。(可能使末梢血管收縮作用增強)

4. 副作用：

(發生率：“罕有”為小於 0.1%，”偶而”為 0.1%～5% (不含)，”時常”為 5% 以上或頻率不明。)

- (1) 過敏：偶而發疹、搔癢等的過敏症狀，症狀發生時應停止用藥。
- (2) 消化道：下痢，偶而噁心嘔吐、胸灼熱、食慾不振、腹痛、上腹部不適等症狀。
- (3) 精神神經系統：偶而嗜睡、口渴症狀。
- (4) 其他：偶而心跳加快、手指冷感。

5. 對高齡者的投與：

一般高齡者的生理機能減量，應注意減量。

6. 對孕婦的投與：

懷孕中投與的相關安全性尚未確立，所以對孕婦或有懷孕可能的婦人，只有在判斷為治療上的有益性大於危險性時才投與。

7. 對小兒的投與：

對小兒投與的相關安全性尚未確立。

8. 過量：

- (1) 徵候、症狀：噁心、嘔吐、頭痛、頻脈、暈眩、末梢血管攣縮的症狀(麻痺、刺痛、四肢疼痛)、昏睡。
- (2) 處置：洗胃及以活性炭將藥物除去。  
小心監視心血管循環及呼吸系統，如果有異益常發生，採取對症療法。  
當動脈攣縮症狀出現時，血管擴張劑可有效治療，但須注意低血壓患者的惡化。  
對於攣縮的末梢血管加溫，可以保護缺血狀態的四肢。

【貯存】：25°C 保存，開封後需避光保存。

【包裝】：6-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

委託製造者：汎宇藥業股份有限公司

地址：台中市北區漢口路三段 84-1 號 2 樓

製造廠：衛達化學製藥股份有限公司

廠址：台中市工業區 23 路 21 號