

克炎寧
COSERRIN
加強消炎噴液劑
36.5mm
58.5mm
110mm
COSERRIN
Forte Anti-inflammatory
Throat Spray
3.0mg/ml "Y. C."
(Benzydamine HCl)
34ml
用法用量
成人或年齡大於12歲的小孩：
直接噴液2-4次(1-2毫克)於疼痛
紅腫部位後緩慢吞服。如有必要
每1.5-3小時可重複使用。
年齡6-12歲的小孩：直接噴液2
次(1毫克)於疼痛紅腫部位後緩
慢吞服。如有必要每1.5-3小時
可重複使用。
6歲以下孩童：不建議使用。
除非在醫師指示之下，連續治療
不應超過7天。
本藥須由醫師處方使用。
4 711457 460083
"元宙" 克炎寧
加 強 消 炎 噴 液 劑
3.0 毫克/毫升(Benzydamine HCl)
34毫升
扁桃腺炎之疼痛
口腔之疼痛
喉嚨痛
COSERRIN
Forte Anti-inflammatory
Throat Spray
3.0mg/ml "Y. C."
(Benzydamine HCl)
34ml
成份
Each ml contains:
Benzydamine HCL 3mg
適應症
舒解口腔及咽喉疼痛，包括下
列疾病或症狀引起的疼痛：扁
桃腺炎、喉嚨痛、放射治療引
起的黏膜炎、鵝口瘡潰瘍、口
腔與牙周手術後疼痛。
注意事項
請詳閱說明書後使用。
直立儲存在25℃以下避光處
衛部藥製字第059220號
GMP G12772
元宙化學製藥股份有限公司
南投市南崗工業區南崗三路272號
TEL:049-2253190
"元宙" 克炎寧
加 強 消 炎 噴 液 劑
3.0 毫克/毫升(Benzydamine HCl)
34毫升
扁桃腺炎之疼痛
口腔之疼痛
喉嚨痛
批　號：
保存期限：