
uədo▲
如發現CABAGIN KOWA外盒開封處有破損和撕毀的狀況時，請勿服用
胃腸藥
"興和"
欣克潰精錠
日本製
日本製
Kowa
日本製
用途(適應症)：
胃酸過多、胃痛、消化不良、健胃
不得使用族群：
1. 正在使用其他腸胃藥者。
2. 哺乳婦。
3. 對本藥任何成分過敏者。
4. 未滿8歲之孩童。
用法用量：
一天三次，每餐飯後用開水或溫開水一起服用。
年齡 | 每次用量 | 1天次數
15歲以上 | 2錠 | 3次
8歲以上至未滿15歲 | 1錠
未滿8歲之孩童 | 請勿服用
類別：本藥為醫師藥師藥劑生指示用藥
諮詢專線：0800-600-566
• 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1. 排尿困難者。
2. 腎臟病、心臟病、青光眼、甲狀腺功能失調、高血壓、腹水、水腫、消化道潰瘍的人。
• 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(1) 目前正接受醫師治療者。
(2) 孕婦或可能懷孕婦女。
(3) 老年人。
(4) 使用者本人或家族有過敏體質者。
(5) 與其他藥品併用時。
批號、製造日期、保存期限標示於外盒。
儲存條件：置於室溫25℃以下避光處
使用前請詳細閱讀說明書
藥商名稱：台灣興和通商股份有限公司
藥商地址：台北市中山區松江路122號8樓
製造廠名稱：Kowa Company, Ltd.
製造廠地址：332-1, Ohnoshinden, Fuji City, Shizuoka Pref., Japan
衛部藥輸字第026386號
40錠
胃腸藥
"興和"
欣克潰精錠
S
胃粘膜を修復する
MMSC
ソウジュツ
リパーゼAP12
藥物資訊
有效成分與含量(每錠)：
Methylmethioninesulfonium chloride 25.0毫克
Magnesium hydroxide 16.67毫克
Sodium bicarbonate 150.0毫克
Calcium carbonate precipitate 200.0毫克
Scopolia extract powder (3 times-diluted) 15.0毫克
Atractylodes lancea rhizome extract 8.33毫克
Powdered swertia herb 5.0毫克
Biodiastase 2000 4.0毫克
Lipase AP12 2.5毫克
其他成分(賦形劑)
Hydroxypropylcellulose, Hydrogenated oil, Carmellose calcium, Corn starch, Magnesium stearate, Glyceryl monostearate, Polyoxyl 40 stearate, Purified shellac, Talc, Powdered cinnamon bark, Partially hydrolyzed polyvinyl alcohol, Microcrystalline cellulose, Hydrated silicon dioxide, l-Menthol
製造批號
製造年月
保存期限
V1205T W7K
7565
11
4 987067 237005