C506

胃腸薬

食べすぎ・胸やけ・二日酔いのむかつき

20包

生薬製剤

# 新甘樫胃腸薬顆粒

（あまがし）

食べすぎ・胸やけ・
食欲不振




（スティックパック）

20包

西薬

## 用法・用量

1日3回食後服用

大人15才以上　1回1包
11才以上15才未満　1回¾包
8才以上11才未満　1回½包
5才以上8才未満　1回⅓包
3才以上5才未満　1回¼包

## 効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）、胃痛、消化促進、消化不良、食欲不振（食欲減退）、食べ過ぎ（過食）、消化不良による胃部・腹部膨満感。

有効期限

製造番号

107. 6. 12

4 522678 010496

1

## 成分・分量

1日量（3包）中1包1.2g
合成ヒドロタルサイト……700mg
炭酸水素ナトリウム……1200mg
ビオヂアスターゼ……300mg
ガジュツ末……100mg
ケイヒ末……260mg
ロートエキス散……300mg
ウイキョウ末……35mg
チョウジ末……30mg

添加物として乳糖水和物、カンゾウ末、パレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ℓ-メントールを含有します。

20包入り
（1包1.2g）

本　　社：新生薬品工業株式会社
本社住所：奈良県高市郡高取町清水谷1269
製 造 所：新生薬品工業株式会社 高取工場
製造所住所：奈良県高市郡高取町清水谷313-1

第2類医薬品

押してあけてください。

衛部藥輸字第026677號

販売名：
新甘樫胃腸藥顆粒

**成分・分量**
**1日量（3包）中含**

| | | |
|---|---|---|
| Synthetic Hydrotalcite | 合成水滑石 | 700mg |
| Sodium Bicarbonate | 碳酸鈉 | 1200mg |
| Biodiastase | 生物澱粉類 | 300mg |
| Powdered Zedoary | 莪述粉末 | 100mg |
| Powdered Cinnamon Bark | 肉桂樹皮粉末 | 260mg |
| Scopolia Extract Powder | 莨菪萃取粉末 | 300mg |
| Powdered Fennel | 茴香粉末 | 35mg |
| Powdered Clove | 丁香粉末 | 30mg |

作為賦形劑,含有Lactose Hydrate、Powdered Glycyrrhiza、Hydroxypropylcellulose、Carmellose Calcium、ℓ-Menthol.

**〔用途（適應症）〕**
緩解胃部不適或灼熱感、胃酸過多、幫助消化。

**〔不得使用族群〕**
(一)曾因本藥成分引起過敏的人 (二)未滿3個月之嬰兒不得服用

**〔用法・用量〕**

| 年齡 | 使用量 |
|---|---|
| 成人及12歲以上 | 一天3次,飯後或需要時服用。<br>成人每次1包(1.2g) |
| 6歲以上未滿12歲 | 適用成人使用量之1/2 |
| 3歲以上未滿6歲 | 適用成人使用量之1/4 |
| 3歲以下 | 請洽醫師診治 |

本品單次劑量之酸中和能力為9.8~12. OmEq
本品單次劑量之鎂含量為3.59mEq 以上
本品單次劑量之鈉含量為1.79mEq 以上

**〔類別〕**
醫師藥師藥劑生指示藥品

**藥商諮詢專線**
林瑋貿易有限公司
台北市中山區四平街14號1樓
電話:02-25511010

騎縫章
藥品藥物管理章

107. 6. 12

生藥配合

# 新甘樫胃腸藥顆粒

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛部藥輸字第 026677 號

**〔成分・分量〕1日量（3包）中含　1包1.2g**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Synthetic Hydrotalcite | 700mg | Powdered Cinnamon Bark | 260mg |
| Sodium Bicarbonate | 1200mg | Scopolia Extract Powder | 300mg |
| Biodiastase | 300mg | Powdered Fennel | 35mg |
| Powdered Zedoary | 100mg | Powdered Clove | 30mg |

作為賦形劑，含有Lactose Hydrate、Powdered Glycyrrhiza、Hydroxypropylcellulose、Carmellose Calcium、L-Menthol.

**〔用途(適應症)〕**

緩解胃部不適或灼熱感、胃酸過多、幫助消化。

**〔使用上注意事項〕**

一、有下列情形者，請勿使用：(一)曾因本藥成分引起過敏的人。 (二)未滿3個月之嬰兒不得服用。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(一) 3歲以下 (二)消化道潰瘍、慢性胃痛、胃部不適或灼熱感的人。(三)有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。 (四)腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症.應謹慎小心使用。) 婦女

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：(一)孕婦、可能懷孕及哺乳婦。 (二)與其他藥品併用時。

四、其他使用上注意事項：(一)為防止兒童誤食請妥善保管。 (二)避免陽光直射。 (三)勿超過建議使用量。(四)一天內不可服用超過一日最大使用量,也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。 (五)如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。 (六)腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。 (七)可能引起腹脹、打嗝。 (八)制酸劑不得併用其他藥品。

**〔用法・用量〕**

| 年齡 | 使用量 |
|---|---|
| 成人及12歲以上 | 一天3次,飯後或需要時服用。成人每次1包(1.2g) |
| 6歲以上未滿12歲 | 適用成人使用量之1/2 |
| 3歲以上未滿6歲 | 適用成人使用量之1/4 |
| 3歲以下 | 請洽醫師診治 |

本品單次劑量之酸中和能力為9.8~12.0mEq
本品單次劑量之鎂含量為3.59mEq 以上
本品單次劑量之鈉含量為1.79mEq 以上

**〔警語〕**

一、服用本藥後,若有發生以下副作用時,請立即停止使用,並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生:

| 身體部位 | 副作用 |
|---|---|
| 胃腸道 | 便祕、噁心、嘔吐、腹瀉 |
| 其他 | 偶有過敏 |

二、服用本藥後,若有發生以下症狀時,請立即停止使用,並接受醫師診治:
(一)若有任何不適情況產生。
(二)連續服用本藥數日後,若症狀沒有改善。

**〔包裝〕**

6～833包 (鋁箔袋盒裝)

**〔保管及取用時之注意〕**

(1) 請存放於25℃以下，避免日光直射並存放於濕氣較少之陰涼場所。
(2) 應置於小孩伸手不及之處。
(3) 避免誤用和保持品質。請勿裝入其他容器內。
(4) 請勿服用過期的本製品。

藥商:林璋貿易有限公司
台北市中山區四平街14號1樓

總公司 : SHINSEI PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO.,LTD.
總公司地址 : 1269, Shimizutani, Takatori-Cho, Takaichi-Gun, Nara, Japan
製造廠 : SHINSEI PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO.,LTD.TAKATORI FACTORY
廠址 : 313-1 Shimizutani, Takatori-cho, Takaichi-gun, Nara, Japan

藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載

市售藥品得僅放置經審查核定之中文仿單。但如市售藥品同時放置中、外文仿單者，外文仿單內容須與核定本之中文仿單內容相符，廠商得依核定之中文仿單自行修正其外文仿單內容。