

150.0

(表) (天)

KAIGEN衛部藥輸字第026788號
醫師藥師藥劑生指示藥品服用時，請務必詳閱本說明書。
請妥善保管以便必要時可閱讀。

解熱鎮痛藥 カイゲンパックIB顆粒

改源[®]IB止痛顆粒

KAIGEN Pac IB Granule

1. 使用本藥會增加發生嚴重心血管栓塞之機率，包括心肌梗塞和中風，且嚴重的話可能會致命。上述症狀可能發生在使用此藥品的早期階段，且使用的時間越長，機率越大。
2. 進行冠狀動脈繞道手術之後14天內禁用本藥。

【本製品的優點】

改源IB止痛顆粒中的有效成分為Ibuprofen，經由抑制前列腺素的過度生成，有效緩解疼痛，配合生藥萃取物(甘草末、芍藥萃取液)製成顆粒狀，為溶解迅速效果快的解熱鎮痛藥。

【成分】

改源IB止痛顆粒3包(4.2g)中含有下列成分：

主成分	含量	作用
Ibuprofen	450 mg	止痛消炎成分，有效抑制前列腺素的過度生成，有效緩解疼痛。
Anhydrous Caffeine	240 mg	幫助抑制疼痛成分發揮作用，緩解疼痛。
Powdered Glycyrrhiza (甘草末)	300 mg	解除肌肉痙攣，緩解疼痛。
Peony Root Extract (芍藥萃取液) (芍藥500 mg)	125 mg	能夠調節肌肉的緊張與鬆弛，緩解疼痛。
其他成分(賦形劑)：D-Mannitol, Carboxymethylcellulose, Light Anhydrous Silicic Acid, L-Menthol, Hydroxypropyl Cellulose, Lactose Hydrate。		

【用途(適應症)】

暫時緩解月經痛、頭痛、牙痛、肌肉疼痛、關節痛、感冒引起之發燒。

⚠【使用上注意事項】

1. 有下列情形者，請勿使用：
 - (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (2) 未滿15歲。
 - (3) 懷孕28週以上。
 - (4) 目前有消化性潰瘍、出血或穿孔的人。曾使用非類固醇消炎藥導致腸胃出血或穿孔的人。具反覆發作之消化性潰瘍或出血病史的人。
 - (5) 嚴重出血傾向(包括嘔吐時出血、通便出血、血便或黑便)。
 - (6) 嚴重肝衰竭。
 - (7) 嚴重腎衰竭。
 - (8) 服用阿斯匹林(aspirin)或其他非類固醇消炎藥之後曾發生氣喘、蕁麻疹、或其他過敏反應的人。
 - (9) 進行冠狀動脈繞道手術之後14天內。
2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (1) 65歲以上。
 - (2) 孕婦、計畫懷孕或可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (3) 曾有消化性潰瘍的人。
 - (4) 有凝血功能異常或曾有相關病史的人。
 - (5) 有肝臟疾病或曾有相關病史的人。
 - (6) 有心臟疾病(例如心肌梗塞、心臟衰竭)或曾有相關病史的人。
 - (7) 曾有藥物過敏的人。
 - (8) 支氣管氣喘的人。
3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (1) 正在使用任何藥品。
 - (2) 高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸的人。
 - (3) 時常飲用酒精性飲料的人。
4. 其他使用上注意事項：
 - (1) 服用本藥只能緩解症狀，無法治療病因。
 - (2) 勿超過建議之使用量，若不慎服用過量，應立即停藥就醫，並攜帶外盒包裝以出示醫師參考。
 - (3) 本藥未經醫師處方或指示，不得長期服用。
 - (4) 若經醫師處方長期使用本藥，應定期回診進行臨床檢查。
 - (5) 酒精警語：不得與酒精性飲料併用，可能造成胃出血。
 - (6) 為防止兒童誤食，請妥善保管。
 - (7) 請勿換裝於其他容器，以免誤用或變質。
 - (8) 超過外盒標示之保存期限時，請勿使用。
 - (9) 儲存於25℃以下。

260.0

品名	カイゲンパックIB顆粒 台灣	制作日	MC	色調	スミ	アカB				トランプ
本コード	0616-0556-50	2019.12.13	(C)							()
仮コード		校	作業者印	AC						角度
		3校	八井		朝日印刷株式会社		r53v9	APP.TB		

