請將本說明書和藥品一起保管，服用前請詳閱。

醫師藥師藥劑生指示藥品　衛部藥輸字第026868號

無糖〈檸檬〉

鎮咳去痰劑 浅田止咳口含錠 Asadaame Sekidome LE

⚠使用上的注意事項

禁止事項 ⊠

[若是未遵守，會使症狀惡化，容易引起副作用]

服用本劑期間，請勿使用以下任一種一藥品：其他的鎮咳去痰劑、感冒藥、鎮靜劑。

1. 若有下列情形，服用前請先諮詢醫師或藥師：
（1）正接受醫師治療者（2）孕婦或準備懷孕者（3）授乳中的人（4）高齡者（5）曾因藥物引發過敏者（6）高燒者（7）已診斷出為心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能障礙者。
2. 服用後若有以下狀況，請立即停止服用，並持此說明書向醫師或藥師商談。

關係部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、癢
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	暈眩

3.服用5~6次症狀也無改善時。

4.本品不宜長期使用。

【用法用量】

請依以下量含於口中，不要咀嚼慢慢溶化服用之。
每次服用時，請間隔2小時以上。

年齡	1次量	服用次數
大人（15歲以上）	3錠	1天6次
9歲以上未滿15歲	2錠	
6歲以上未滿9歲	1錠	
未滿6歲	請勿服用	

●請遵守規定的用法用量。

●兒童服用時，請在保護者陪同監護下服用。

【成分含量】18錠中

dl-Methylephedrine Hydrochloride	37.5mg	鎮咳
Potassium Cresolsulfonate	135mg	使痰容易咳出
Cetylpyridinium Chloride Hydrate	3mg	預防發炎

賦形劑:Hydrogenated Starch Syrup、Hydrogenated Maltose Starch Syrup、Dipotassium Glycyrrhizinate、DL-Malic Acid、Lemon Oil、Acacia、Carnauba Wax、Caramel、l-Menthol、Talc、White Beeswax、Silicon Resin、Sorbitan Esters of Fatty Acids、Glycerol Esters of Fatty Acids、Sodium Carboxmethylcellulose、Lemon Flavor 、Powdered Hydrogenated Maltose Starch Syrup。

【適應症】

鎮咳、祛痰、咽喉痛及發炎之緩解(咳嗽、痰、喉嚨發炎引起的喉嚨乾、喉嚨不舒服、喉嚨痛)。

【保管及儲存之注意事項】

（1）對於未滿6歲的兒童，恐有錠劑卡在喉嚨之虞，請避免服用。（2）保存於避免日光直射且濕氣少之陰涼處(25℃以下)。（3）請保存於兒童伸手不及處。（4）請勿換裝於其他容器（因誤用等導致品質變化）。（5）過期產品請勿服用。

醫師藥師藥劑生指示藥品　衛部藥輸字第026868號

製造廠 株式会社浅田飴 ASADAAME Co., Ltd.
(O) 2-6-1, Kaji-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
(P) 5-29-7, Kumegawa-Cho, Higashi-Murayama City, Tokyo, Japan

藥　商 大法貿易股份有限公司
台北市忠孝東路四段107號8樓-1 (02) 2763-7101