退敏快膜衣錠120毫克
Telfast 120mg Film-Coated Tablets "France"

SANOFI

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛部藥輸字第026910號

【有效成份及含量】
Fexofenadine hydrochloride 120 mg 膜衣錠。

【其他成份（賦形劑）】
Microcristalline cellulose、Pregelatinized Starch、Sodium croscarmellose、Magnesium stearate、Hypromellose、Macrogol 400、Titanium dioxide、Anhydrous colloidal silica、Povidone、Yellow iron oxide blend、Pink iron oxide blend、Purified Water。

【用途（適應症）】
暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）或皮膚搔癢。

【使用上注意事項】
一、有下列情形者，請勿使用：
（一）曾經因本類藥物引起過敏症狀者。
（二）本藥會被分泌至乳汁中，因此授乳婦不可使用。
（三）正在服用下列藥物者：
1. 其他的抗過敏用藥（包含皮膚患疾用藥、鼻炎用內服藥）及含有抗組織胺劑的內服藥等（感冒藥、鎮咳去痰藥、暈車藥、鎮靜安眠藥等）。
2. 可能會引起交互作用的藥品，如制酸劑（含有**Aluminium hydrate**、**Magnesium hydroxide**之製劑）及**Erythromycin**、**Ketoconazole**等。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
（一）**12**歲以下兒童及**65**歲以上長者。
（二）腎臟疾病患者。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
孕婦及疑似懷孕者。

四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

五、為防止兒童誤食請妥善保管。

六、使用前後請勿服用酒精性飲料。

七、請勿與果汁併服。

八、連續服用本藥一週後，若症狀沒有改善，應停藥立即就醫。

【用法用量】

成人及12歲及以上兒童	一次60毫克，一天兩次，早晚用或一次120毫克，一天服用一次。
12歲以下的兒童及65歲以上長者	請洽醫師診治。
腎臟疾病患者	請洽醫師診治。

【警語】
一、服用本藥後，若有發生以下輕微短暫性副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

關係部位	症狀
神經系統	頭痛、嗜睡、疲倦、暈眩、背痛、失眠、神經不安、睡眠障礙或夢魘。
皮膚	皮疹、蕁麻疹、搔癢。
消化系統	噁心、消化不良。
其他	發燒、中耳炎、痛經、上呼吸道感染。

二、服用本藥後，若有發生以下罕見但較嚴重症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：全身過敏性反應如血管浮腫、胸有壓迫感、呼吸困難、潮紅等。

【包裝】
2-7錠PVC/PE/PVDC鋁箔盒裝。

【儲存】
- 安全密封：若外盒已開封或個別的鋁箔包裝已撕開或開封，則請勿使用。
- 請儲存於30℃以下，避免過度潮濕。

製造廠
Sanofi Winthrop Industrie
30-36, avenue Gustave Eiffel
37100 Tours, France

藥商
賽諾菲股份有限公司
台北市信義區松仁路3號7樓

Ref. US labeling

20160815