

紺 赤

【才モテ面】

本藥成分屬於非類固醇消炎止痛藥成分(NSAIDs)

日方消炎止痛膜衣錠200毫克

IBUPURON TABLET イブプロン

衛部藥輸字第027387號

1. 使用本藥會增加發生嚴重心血管栓塞之機率，包括心肌梗塞和中風，且嚴重的話可能會致命。上述症狀可能發生在使用此藥品的早期階段，且使用的時間越長，機率越大
2. 進行冠狀動脈繞道手術之後14天內禁用本藥

【成分】 每錠中含有 有效成分及含量 Ibuprofen 200 mg

其他成分(賦形劑)：Microcrystalline Cellulose, Hydroxypropylcellulose, Croscarmellose Sodium, Light Anhydrous Silicic Acid, Magnesium Stearate, Hypromellose, Titanium Oxide, Macrogol 400, Red Ferric Oxide, Yellow Ferric Oxide, Carnauba Wax

【用途(適應症)】
暫時性解除頭痛、肌肉疼痛、關節炎的輕度疼痛、牙痛、輕度疼痛及與感冒有關的疼痛、經痛及解熱作用

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
1)曾因本藥成分引起過敏的人 2)目前有消化性潰瘍、出血或穿孔的人。曾因使用非類固醇消炎藥導致腸胃道出血或穿孔的人。具反覆發作之消化性潰瘍或出血病史的人 3)有嚴重出血傾向的人(包括嘔吐時出血、通便出血、便血或黑便) 4)有嚴重肝衰竭的人 5)有嚴重腎衰竭的人 6)服用阿斯匹林(Aspirin)或其他非類固醇消炎藥之後曾發生氣喘、蕁麻疹、或其他過敏反應的人 7)進行冠狀動脈繞道手術之後14天內，不得使用

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1)未滿12歲、65歲以上 2)孕婦、計畫懷孕或可能懷孕婦女及哺乳婦 3)曾有消化性潰瘍的人 4)有凝血功能異常或曾有相關病史的人 5)有肝臟疾病或曾有相關病史的人 6)有心臟疾病(例如心肌梗塞、心臟衰竭)或曾有相關病史的人 7)曾有藥物過敏的人 8)支氣管氣喘的人

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
1)正在使用任何藥品 2)高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸的人 3)時常飲用酒精性飲料的人

四、其他使用上注意事項：
1)服用本藥只能緩解症狀，無法治療病因 2)勿超過建議之使用量，若不慎服用過量，應立即停藥就醫，並攜帶外盒包裝以出示醫師參考 3)本藥未經醫師處方或指示，不得長期服用 4)若經醫師處方長期使用本藥，應定期回診進行臨床檢查(尿液檢查、血液檢查及肝功能檢查) 5)酒精警語：不得與酒精性飲料併用，可能造成胃出血 6)為防止兒童誤食，請妥善保管 7)避免陽光直射

【用法・用量】

成人	症狀持續時，每4-6小時服用1錠。若服用1錠後，疼痛及發燒現象沒有改善，可服用2錠。但除非有醫師指示，24小時內勿服用超過6錠。須使用最小有效劑量
兒童	除非有醫師指示或監護，12歲以下兒童不得使用本藥

若服藥時有偶發性及中度心灼熱、胃不適或胃痛，可併服用食物或牛奶。若上述症狀的嚴重程度達中度以上或持續發生便須就醫

紺 赤

【ウラ面】

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	皮膚癢、起疹子
消化系統	胃部(肚臍上方)不舒服、腸胃脹氣、便秘、拉肚子
精神及神經系統	抑鬱
其他	頭痛、頭暈

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- 1.已使用本藥用來退燒超過3天或用來止痛超過5天，症狀未緩解或更惡化時
2.有下列症狀：

身體部位	副作用
血液	再生不良性貧血(可能症狀：出血、傷口出血不止、容易感染、發燒、寒顫)、顆粒性白血球缺乏(可能症狀：容易感染、發燒、寒顫)、血小板減少(可能症狀：出血、傷口出血不止)
過敏症	史蒂文氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症(可能症狀：皮膚紅疹、搔癢或水泡；口腔潰瘍；喉嚨痛；眼睛紅腫、灼熱；臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨出現腫脹；發燒)、氣喘(可能症狀：呼吸出現喘鳴聲、呼吸短促、呼吸困難)
眼睛	視覺異常
耳朵	重聽、耳鳴
肝臟	黃疸(眼白變黃)、肝功能指數GOT/GPT(ALT/AST)異常
消化系統	胃痛或有灼熱感、血便
口腔	口內炎(口腔潰瘍或發炎)
心臟血管系統	心臟衰竭與水腫(可能症狀：疲倦、心跳加速、呼吸困難、浮腫)、心肌梗塞(可能症狀：胸部隱約疼痛、胸悶、呼吸不順暢)、低血壓(可能症狀：暈厥)
其他	體溫過度下降、四肢冰冷

【包裝】 6-1000 粒PTP/PVC鋁箔盒裝

【儲存】 25°C以下儲存

【藥理特性】(依文獻記載)

●日方消炎止痛膜衣錠200毫克之主要成分Ibuprofen是Phenylpropanoic Acid的衍生物，係由英國Boots公司所開發的新非類固醇非比林系之抗發炎、鎮痛、解熱劑，可藉由阻斷前列腺素(Prostaglandin)的合成來產生效果。在臨床醫療效果顯現具作用時間長、吸收快、藥效迅速。口服製劑投與後，能在24小時內經由尿液排出，無蓄積滯留。亦不會產生習慣性，被廣泛應用於外科、齒科、婦科等各科各類領域，其主要的藥理特性如下：

一、臨床結果顯示，Ibuprofen之鎮痛和抗炎作用比Aspirin強2-8倍。而在動物實驗藥理活性上，Ibuprofen抗炎作用比Aspirin強16-32倍，解熱作用強20倍。二、投與本劑後，60-120分鐘即可達到血中最高濃度。又Ibuprofen之蓄積性依存性之試驗結果顯示，本藥投與無成癮性及藥物蓄留之跡象。Ibuprofen以無藥理活性代謝物之型式於24小時內經由尿液排除。藥物劑量至800mg

血中濃度呈線性 三、應用範圍廣泛：對各科、各種、各類炎症性疾患，及所併有之疼痛、發熱，以及感冒症候群均適用 ◆針對兒童及成人群組之試驗結果顯示，Ibuprofen對止痛、發燒之治療效果較Acetaminophen強，二種藥物具有相同的安全性 ◆針對中度至嚴重偏頭痛症狀之成人試驗Ibuprofen 200mg和400mg可於2小時內降低疼痛至完全排除疼痛 ◆Ibuprofen緩解經痛之效果較Acetaminophen強(降低Menstrual fluid PGF2α的程度比Acetaminophen高35%) ◆治療風濕性關節炎上，Ibuprofen在藥效與接受度上都與Aspirin一樣令人滿意

◆Ibuprofen在分娩後會陰的止痛效果優於Acetaminophen，且無任何副作用 ◆Ibuprofen 200-400mg對於治療一般頭痛之效果較Acetaminophen 1000mg及Aspirin 500-1000mg強 ◆依據動物和人體之比較試驗證明Ibuprofen傷胃風險極低

製造廠：SHISEIDO PHARMACEUTICAL INC. 藥商：德佑藥品有限公司
220-1, CHIHARA OAZA GOSE-CITY NARA, JAPAN. 台北市松山區敦化南路一段3號2樓

製造販售元：至誠堂製藥株式會社 日本奈良県御所市茅原220-1 版No.1