

新興毒品變裝多 揭開糖衣大解密

報告人：簡希文簡任技正

管制藥品組
106年5月31日



衛生福利部
食品藥物管理署
Food and Drug Administration

我國藥物濫用之演變

速賜康、紅中、白板



民國70年代

80年代

MDMA、愷他命



90年代

98年以後




安非他命



合成卡西酮類
苯丙胺類
類大麻活性物質



99年至105年濫用藥物尿液檢驗前3名成分統計



資料來源：藥物濫用案件暨檢驗統計資料

合成卡西酮類檢出情況




註：陽性率=合成卡西酮類陽性件數/總陽性件數


4

資料來源：藥物濫用案件暨檢驗統計資料

合成卡西酮類併同其他物質檢出情形



合成卡西酮類之危害



精神症狀：
幻覺、妄想、
焦慮、憂鬱、
失眠、攻擊性

心臟血管症狀：
血壓上升、心悸、
胸痛、四肢冰冷

痙攣、抽搐、
體溫上升

行動一

CHERISH

珍愛生命



1. 做自己的主人
2. 學習交友技巧
3. 增強自我的堅韌性




行動二

REFUSE

防毒拒毒



1. 遠離是非場所
2. 拒絕成癮物質
3. 學會拒絕技巧
4. 要High不藥害



行動三

STOP

知毒反毒



1. 認識毒品作用
2. 了解新興毒品
3. 打擊不法
4. 防範毒品危害



四行動 CHERISH · REFUSE · STOP · CARE 反轉



行動四

CARE

關懷協助



1. 發現吸毒者的徵兆
2. 提供專業協助與轉介



感謝聆聽



衛生福利部
食品藥物管理署
Food and Drug Administration