





兒童正確用藥與安全

~五大核心能力~

2009年編制
2010年增修
2011年增修



正確的用藥來自



正確用藥五大核心能力

☉ 【學習目標】

- 一. 清楚表達自己的身體狀況-說清楚
- 二. 看清楚藥品標示-對明白
- 三. 清楚用藥方法、時間-用正確
- 四. 做身體的主人-愛自己
- 五. 與醫師、藥師做朋友-做朋友



正確用藥五大核心能力

一、清楚表達自己的身體狀況

清楚表達
身體狀況



看病時應告訴醫師的事項-1

✿ 清楚陳述自己的症狀

- ✿ 不舒服的部位、情況，例如：頭痛、發燒、頭暈、噁心、食慾不振、皮膚紅斑、流鼻水、腹瀉…
- ✿ 發生的時間…等，例如：(7天前)全身疲倦，(3天前)開始噁心食慾不振，(昨天)小便變成濃茶色，(今天上午)眼白變黃…

✿ 疾病發作時間多久？

✿ 症狀出現順序！

✿ 每次不舒服時間持續多久？

看病時應告訴醫師的事項-2

✚ 個人特殊狀況

▣ 藥物過敏

- 藥物過敏史：藥名是什麼？
- 過去使用藥物副作用：藥名是什麼？

▣ 飲食特殊情形（例如素食、低糖、低鹽等）


✚ 病史

▣ 包括開刀、住院、醫學檢驗結果、有無家族性疾病

看病時應告訴醫師的事項-3

🌀 目前正在使用的藥品

🌀 包括中藥、維他命、健康食品、特殊食品等。



正確用藥五大核心能力

二、看清楚藥品標示

領藥須知

1. 出示健保卡或身份證件
2. 確認是自己的藥
3. 藥袋標示的資訊清楚完整
(藥名、作用、用法)

拿任何藥時，

請注意「藥袋、藥品包裝」上

應有的標示！！



你看得懂藥袋標示嗎？

領到藥品時，核對藥袋的姓名是否正確。避免拿到別人的藥品，保障自己及他人的用藥安全。

醫院
999號

知道藥品的療程要吃多久，並核對應領到藥品的總數量。

服藥前先確認用藥途徑、方法、用藥時間及每次劑量。才能在正確時間點使用正確劑量，使藥品發揮最佳療效。

領藥號

姓名：XXX

性別：男

年齡：X歲

給藥天數：

7天

飯後 每次一粒

名：

Acetaminophen 80mg tab

乙醯胺酚錠劑

藥物外觀描述：

圓形 白色錠劑

特殊注意事項：(副作用)

請注意：每瓶、藥瓶指示服用

1. 要知道藥品的副作用。
2. 要知道警語及特別注意事項。

用途：

解熱鎮痛

核對藥品實物及藥袋上藥名是否正確。

藥袋上標示的用途是否治療您本次看的病。

效期與貯存

領藥後六個

有任何用藥問題，請撥打藥物諮詢專線

：黃00藥師 覆核藥師·陳00藥師

請核對藥袋姓名，當面點清藥品數量及種類 藥物諮詢專線：23456789

正確用藥五大核心能力

三、清楚用藥方法、時間



• 先看清楚使用途徑

- 內服

- 外用



• 不一定膠囊、錠劑長相就是口服使用



註:支氣管擴張劑

確認服用方法

- ❖ 緩釋錠：不能咬碎
- ❖ 腸衣錠：不能咬碎、不能與制酸劑同時服用
- ❖ 制酸錠：咬碎作用好



適合小兒口服的劑型

- 錠劑
- 膠囊
- 粉劑
- 液劑：酏劑、糖漿劑
溶液劑、懸浮劑



兒童用藥



不合格的兒童用藥

這是台灣普遍存在的現況



台灣一般兒童常服用的五顏
六色、不清不白的藥水



兒童專用藥


先進國家普遍使用，台灣部分
醫療院所提供

類 型	問 題	特 色
<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用大人的藥丸錠劑，磨成粉給小朋友吃。 2. 錠劑剝半。 3. 藥水分裝，無完整標示說明。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 很苦、有怪味，不易餵食，反造成病兒嘔吐。 2. 不易掌握吃進的藥量。 3. 磨粉藥品易變質。 4. 藥物在磨粉器裡相互污染。 5. 無法從外觀再次確認個別藥品的種類及量等訊息。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依小朋友需求，選擇合適劑型。如液劑、糖漿、顆粒、咀嚼錠等。 2. 附專用的量具、餵藥器。 3. 不苦、好餵食。 4. 劑量好掌握。 5. 標示完整、清楚，可一再確認藥品正確性及安全性。

正確用藥五大核心能力

三、清楚用藥方法、時間

- ✦ 口服藥品應以溫開水服用
- ✦ 服藥應依每日規定時間
- ✦ 飯前與飯後服藥時間標準化



口服藥品應以溫開水服用

☀ 口服藥品應以溫開水服用

- ❑ 除非有特別註明，否則不要以茶、果汁、牛奶、咖啡等飲料配服藥品
- ❑ 有些交互作用可能使藥品吸收變差，影響療效




服藥應依每日規定時間

服藥應依規定時間

	早餐	午餐	晚餐	睡前
一天四次	★	★	★	★
一天三次	★	★	★	
一天二次	★		★	
一天一次	每天固定一個時間			

(如有三餐時間不正常的狀況，領藥時可以諮詢藥師)

一天一次



☉ 任一固定時間

☐ 指自己習慣、方便、不容易忘記的時間

☉ 睡前

☐ 鎮靜安眠劑



一天四次與每六小時一次

不同目的：

一天四次：症狀治療

• 例如：止痛藥

每六小時一次：維持固定血中濃度

• 例如：抗生素



同樣是3次，差很大！



資料來源：台灣電視台

飯前與飯後



✚ 飯前（空腹）

- ❑ 時間：飯前一小時或飯後二小時
- ❑ 哪種藥物須空腹：易被食物影響吸收、胃腸刺激性小的藥物

✚ 飯後

- ❑ 時間：飯後一小時內皆可服用
- ❑ 哪種藥物須飯後服用：可藉食物協助吸收、減少腸胃刺激的藥物

兒童用藥衛教

兒童不是縮小的大人



兒童非成人縮小版

✿ 胃部吸收

胃腸蠕動在新生兒及幼兒較慢


→ 增加部分藥品吸收



□ 肝臟代謝

新生兒肝臟功能只有大人的
20~40%

兒童非成人縮小版



✿ 腎臟排除

新生兒的腎功能約只有大人的30%，1歲左右才達到成年人水準

□ 皮膚吸收

嬰幼兒皮膚通透性高，對於外用藥品的吸收較好。





磨粉分包的藥 使用比較方便？

- ✦ 使用大人的藥品磨粉較易受污染
- ✦ 分包後的藥品安定性變差，保存期限較短
- ✦ 多種藥品混合研磨容易變質或產生交互作用
- ✦ 人工分包藥品劑量不精確，影響藥物療效
- ✦ 可以切割器取得正確劑量，再用湯匙壓碎
- ✦ 大一點的孩子可練習吞服或與少量食物併服



兒童用藥須知

- ❊ 並非全部藥品都適合磨粉：藥品磨粉較易受污染，藥品安定性變差，保存期限較短，並可能產生交互作用
- ❊ 可請醫師開立兒童專用藥品，或由家長在使用前以切割器取得正確劑量，再用湯匙壓碎
- ❊ 已磨粉分包之藥品應於當次吃完，不宜留存；當藥品變質時請勿繼續服用

一時方便，終身不便！




台視
財經台

WHO
醫師開錯藥
兒童 > 成人
3倍

兒童用藥不安全 避免磨成粉

NEWS EVENING NEWS



糖漿或懸浮液的使用方式小叮嚀

- ✿ 未開封使用的糖漿或懸浮液室溫保存即可
- ✿ 乾粉懸浮液第一次使用前應依照指示加入冷開水混合均勻，每次給藥前需再次搖勻
- ✿ 開封使用之藥品應依照指示冷藏或室溫保存至個別之有效期限
- ✿ 給藥時應以有刻度的量杯或滴管



嬰兒給藥方式


- ✿ 使用有刻度的吸管或口服注射器
- ✿ 抱在膝上，支撐頭部
- ✿ 一次只給少量藥品以防嗆到
- ✿ 將藥品滴在口腔的後方或邊緣
- ✿ 給藥時要同時安撫嬰兒



幼兒給藥方式


- ✿ 由幼兒選擇服藥的姿勢
- ✿ 必要時，用少量食物或美味飲料掩蓋味道，服藥後喝水或飲料去除味道
- ✿ 使用兒語給予簡單的指示，使他們合作
- ✿ 如需服用多種藥品，由幼兒選擇服藥順序
- ✿ 用語言或接觸鼓勵幼兒合作
- ✿ 讓幼兒熟悉量具

栓劑給藥方式






眼用藥給藥方式



眼藥水



眼藥膏



耳滴劑給藥方式



大人將外耳向上拉



幼兒需將外耳向下拉

兒童吐藥

小孩吃了藥如果吐出來，是否需要補吃
吃藥後馬上嘔吐

→ 馬上補服藥品

吃藥後半小時後才嘔吐

→ 不需要再補服藥品



如何儲存藥品？



藥品貯存原則-1



❊ 避光、防潮/避濕、避熱儲存

- ❑ 浴室不可：又濕且熱的地方，藥品容易變質
- ❑ 家中陽光與光線較強的地方不可

❊ 陰涼處

- ❑ 暗處的抽屜或櫃子

❊ 需要冷藏的藥品

- ❑ 放置於冰箱冷藏室攝氏2-8°C之間

❊ 需要特別避光的藥物，如：某些眼藥水

- ❑ 用原來提供的不透明塑膠袋來盛裝

❊ 置放於小孩不可以碰觸的地方



藥品貯存原則-2

- ❊ 內服藥品與外用藥品**分開**
- ❊ 不同藥品不要混雜在一起
- ❊ 將藥品連原包裝置於密閉容器中**儲存**
 - ❑ 罐內所附的棉花和乾燥劑，開罐後就必須立刻丟棄(乾燥劑應小心避免幼童誤食)
 - ❑ 保留包裝容器或藥袋的完整性，以免辨識困難
- ❊ **保留**及貯存說明書、原包裝(易於辨識、參考)
- ❊ **保留**有效日期、用法及用量的相關資料
- ❊ **玻璃容器**比塑膠袋好



正確保存藥品



藥品亂放 小寶貝難保安康



阿嬤泡奶加鈣粉 11月嬰腎結石

2010-10-30 | 中國時報 | 吳敏菁／彰化報導

才十一月個大的小男嬰，最近被醫院診斷罹患腎結石，令醫師驚訝不已！因為從國內泌尿學術研討會和論文中，未曾見過這麼小的病例，原以為奶粉出狀況，經追蹤病史，發現男嬰阿嬤每次沖泡奶粉都添加綜合鈣粉，疑似攝取過量維生素D 3，引發腎盂和輸尿管下段各長出一點四公分和一點二公分的結石。

彰化基督教醫院小兒科蔡易晉醫師表示，這名幼小的腎結石患者，第一次發燒就出現尿道感染現象，不久又感染腸病毒，引發心肌炎住進加護中心治療，進行超音波與電腦斷層掃描，赫然發現男嬰的腎臟竟長出一枚鹿角狀的結石，連輸尿管下段也有，合併腎臟水腫現象。

從分析血液檢驗報告，蔡易晉還發現男嬰血中磷值與尿液檢驗鈣值偏高，另外血中副甲狀腺荷爾蒙正常，但血中影響鈣質吸收的維他命D 3的濃度，卻比正常值高出一倍之多，懷疑男嬰飲食維生素D 3過量，造成鈣質累積過多無法代謝，才引發了腎臟結石。

感冒糖漿 ≠ 含糖飲料

CNN

民視新聞台

54 DEATHS
RELATED TO
DECONGESTANTS

- 54起致死病例
與鼻塞藥有關
- 69起致死病例
與抗組織胺藥
有關

美國

加權
9532.00

2歲以下幼童 感冒糖漿誤用恐致命

12:30 國是黨拓選黨高 游錫堃·不正黨

猜猜我是誰？



藥品安全效期

藥品

未開封：以出廠有效期為主

開封：一般以6個月為原則（保存良好的情況下）

磨粉分包效期較短

特殊藥品

部分懸浮液劑冷藏可放置7~14天



正確用藥五大核心能力

四、做身體的主人

做身體的主人-用藥五不原則



不聽別人推薦的藥



不信有神奇療效的藥



不買地攤、夜市、網路、遊覽車上所販賣的藥。



不吃別人贈送的藥



不推薦藥品給其他人

健康食品不健康
？
想要強身變傷身
！



亂購買自製藥丸,
一吃健康就完蛋!?



資料來源：中華電視台
民間全民電視台



電台藥： 誰在買？

非法藥品亂買
自身健康變壞



資料來源：台灣電視台
民間全民電視台




不『藥』亂吃

資料來源：民間全民電視台
中天新聞台

拒絕來路不明的藥品

2011年4月1日 / 星期五 自由時報 健康醫療 D12



小胖子減重

勿亂吃減肥藥

文 / 廖池欽

許多父母帶著孩子去健身房減肥，並希望孩子能再長高一點，但是要求孩子太多運動的，往往家長手重，揮霍開支：「上了課，就懶得動，怎麼可能減肥？」可是，家長並不知道缺乏運動的結果會讓孩子的生長板沒有受到刺激，導致學齡長不高，並且在過度飲食的狀況下，造成肥胖症。

太早減肥恐永遠長不高

又矮又胖的小朋友會使家長心急如焚，但這時千萬不能隨便吃減肥藥，否則可能造成孩子永遠長不高的悲劇。

一般減肥藥物，最常見的成分就是麻黃素 (ephedrine) 與偽麻黃素 (pseudoephedrine)。對成年肥胖者是良藥，但是對年齡生長板尚未發育的孩子而言，卻是可能造成腿骨發育，不再發育。

生長板一旦癒合便停止了長高的過程，這註定了孩子一輩子要依賴仰望別人，所以肥胖症的小孩是不適合服用減肥藥的。

有百分之五生長需要耗費大量的能量，所以孩提時期圓滾滾的身材在青春時期，會變得修長有型。一方面是因為能量被消耗，自然就瘦下來，另一方面也因為長高而「拉長」了體型，所以治療中斷孩子的肥胖造成惡果讓孩子長高而非減肥，除非是非常嚴重地影響心肺功能，否則不必用藥，而且忌用麻黃素類的減肥藥。

跳床運動最適合長高

動，每日至少一千下，孩子既喜歡而效果又佳。

不過仍要提醒家長謹慎判斷：「發賣」與「學業」孰重孰輕？學業成績好可以買，社會上的名師大德，學業成績好可以買。

▲跳床跳來運動可減肥，又可長高。(圖片提供 / 廖池欽)



GTV 中視

黑心減肥藥致死 藥頭輕判家屬怒

8/7 12:20

彰化 26-32 報

◎中華民國紅十字會總會募款賑濟


資料來源：自由時報、中華電視台

如何獲得藥物資訊？

藥物資訊依藥物取得方式有藥物原廠包裝標示說明書（仿單）或藥袋標示：

藥物原廠包裝說明	藥袋標示（衛生署規定）
1.廠商名稱及地址	1.姓名
2.藥物品名	2.性別
3.許可證字號	3.藥名
4.藥物分級類別	4.單位含量
5.製造日期或批號	5.數量
6.主要有效成分含量、用法、用量	6.用法
7.適應症或效能	7.用量
8.副作用、禁忌及其他注意事項	8.調劑者姓名
9.有效期限或保存期限	9.調劑或交付日期
	10.調劑地點名稱
	11.調劑地點地址
	12.調劑地點電話
	13.警語
	14.主要適應症（此為建議標示）
	15.主要副作用（此為建議標示）
	16.其他用藥指示（此為建議標示）

合法藥品應有下列資訊



中文品名

廠商名稱
廠商地址

主要成份、含量
適應症、用法用量

藥品分級、保存期限

儲存條件
製造日期或批號
許可證字號



國內不法藥物之型式

• 藥品類

- 未經核准之藥品
- 經核准但非屬原製造者之藥品
- 標示誇大不實之藥品

• 食品

- 食品摻加西藥
- 食品／健康食品宣稱療效、誇大不實

• 中草藥

- 未經核准不知名”黑藥丸”
- 摻加西藥之（草）藥

經衛生署檢驗發現，被檢驗出摻加西藥成分以標榜具「壯陽」、「減肥」及「消炎鎮痛」作用之三類產品最多。

行政院衛生署不法藥物專區

行政院衛生署不法藥物查緝 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

地址(D) <http://www.doh.gov.tw/IllegalMedicine/false.htm>

Windows Live 好友動向 個人檔案 郵件 相片 行事曆 MSN 分享 登入

回首頁 · 回衛生署

行政院衛生署食品藥物管理局

Food and Drug Administration, Department of Health, Executive Yuan

不法藥物專區

行政院衛生署不法藥物查緝

偽禁藥辨識圖檔

- 大幸正露丸 (SEIROGAN) | [圖1](#) | [圖2](#) | [圖3](#) | [圖4](#) | [圖5](#)
- 百靈佳樂可舒腸溶糖衣錠 5公絲 (DULCOLAX E.S.C. TABLETS 5MG (BISACODYL)) | [圖1](#) | [圖2](#)
- 羅氏鮮 (Xenical) | [圖1](#)
- "亞培" 諾美婷膠囊 (REDUCTIL CAPSULES) | [REDUCTIL真偽藥辨識說明](#)
- 使蒂諾斯 10公絲膜衣錠 (STILNOX) | [如何分辨Stilnox之偽禁藥.ppt](#)
- 威而鋼膜衣錠 (VIAGRA FILM-COATED TABLETS) | [威而鋼真假藥變識圖](#)
- 犀利士膜衣錠 (CIALIS) | [圖1](#)
- 柔沛膜衣錠 (PROPECIA F.C. TABLETS) | [圖1](#) | [圖2](#) | [圖3](#) | [圖4](#) | [圖5](#) | [圖6](#) | [圖7](#) | [圖8](#) | [圖9](#)
- 脈優錠 (NORVASC TABLETS) | [norvasc真偽藥辨識說明](#)
- 善存膜衣錠 (CENTRUM F.C.TABLETS) | [圖1](#) | [圖2](#) | [圖3](#) | [圖4](#)
- 善胃得錠 (ZANTAC TABLETS) | [圖1](#) | [圖2](#)
- 銀寶善存膜衣錠 (CENTRUM SILVER F.C.TABLETS) | [圖1](#) | [圖2](#) | [圖3](#) | [圖4](#) | [圖5](#)
- 樂酸克膠囊 20公絲 (LOSEC 20MG CAPSULES) | [圖1](#) | [圖2](#) | [圖3](#) | [圖4](#) | [圖5](#) | [圖6](#) | [圖7](#) | [圖8](#) | [圖9](#) | [圖10](#) | [圖11](#)
- 熱威樂素錠 (ZOVIRAX TABLETS 200MG) | [圖1](#)
- 膚潤康益福軟膏 (FLUCORT-F OINTMENT) | [圖1](#) | [圖2](#) | [圖3](#) | [圖4](#) | [圖5](#)
- 維骨力 (VIARTRIL-S CAPSULES) | [圖1](#) | [圖2](#) | [圖3](#) | [圖4](#) | [圖5](#)
- 骨力膠囊(硫酸固可沙明)(CASEAL CAPSULES[GLUCOSAMINE SULFATE]ST) | [圖1](#) | [圖2](#)
- 樂威狀 (LEVITRA) | [圖1](#)
- 保栓通 (Plavix) | [圖1](#)

http://www.doh.gov.tw/IllegalMedicine/index.htm

Internet

<http://www.doh.gov.tw/IllegalMedicine/false.htm>

藥物查詢

The screenshot shows the Microsoft Internet Explorer browser window displaying the website http://www.doh.gov.tw/cht2006/index_populace.aspx. The browser title is "一般民眾-行政院衛生署 - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL. The page content includes a navigation menu on the left, a main content area with "焦點新聞" (Focus News) and "本署公告" (Bureau Announcements), and a right sidebar with various services and news. The "藥物辨識資料查詢" (Drug Identification Information Query) link in the left sidebar is highlighted with a red box.

網)
線上申辦服務專區
統計資料
性別主流化專區

常用查詢

- 醫事人員執業資料查詢
- 醫事機構開業登記查詢
- 貿易便捷化作業進度查詢
- 藥物、化粧品廣告申請專區
- 西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢
- 藥物辨識資料查詢**
- 食品違規案件查詢
- 各縣市救護車資料查詢
- 醫材GMP與QSD認可查詢
- 遊說法專區
- 民眾申請案流程查詢

消費者資訊

- 食品藥物消費者知識服務網
- 不合格食品資訊

員工專區

真相說明
影音白板 news!

衛教影音
專區

起雲劑遭塑化劑
污染專區 new!
專線 (02)2787-8200(20線)

焦點新聞

- 2011/06/17 關心孩子們的健康，讓校園不再有菸害
- 2011/06/17 食品藥物管理局說明有關Baxter Healthcare (Asia) Pte. Ltd公司自主回收1批Highly Concentrated Potassium Chloride注射液，國內並未輸入該公司所回收的藥品
- 2011/06/17 夏日運動防中暑 補充水分最重要
- 2011/06/17 東南亞旅遊熱門景點柬埔寨吳哥窟爆發登革熱肆虐疫情，民眾出國時應小心防範蚊蟲叮咬
- 2011/06/16 針對美國FDA發布更新防曬產品之標示管理規定 食品藥物管理局提出說明

本署公告

- 2011/06/16 公告辦理「100年度一般護理之家評鑑計畫」
- 2011/06/17 100年度公開甄選「醫院身心障礙鑑定品質提升暨轉銜新制計畫」
- 2011/06/15 2011全國食品安全會議相關資訊(已額滿)
- 2011/06/15 公告(增列)臺北市松山醫院為99年度新制精神科醫院評鑑合格醫院
- 2011/06/14 行政院衛生署補助醫事機構及民間團體辦理莫拉克颱風災後心理重建計畫第2次徵求計畫說明書

衛生署健康電子報
健康電子報訂閱
請輸入您的信箱
訂閱 取消訂閱

政府資訊公開

觀看全部宣傳訊息

起雲劑遭塑化劑污染專區
消費者服務專線 02-27878200

衛生署近3年
施政績效

一年期醫師畢業後
一般醫學訓練計畫

長期照護保險居家服務
項目成本分析調查

長期照顧專區

<http://licnquery.fda.gov.tw/DO81E0.asp>

http://www.doh.gov.tw/cht2006/index_populace.aspx



[回主畫面](#)

請輸入查詢條件			
許可證字號	<input type="text"/> 字第 <input type="text"/> 號	顏色	<input type="text"/>
中文品名	<input type="text" value="普拿疼"/>	外觀尺寸	<input type="text"/>
英文品名	<input type="text"/>	刻痕	<input type="text"/>
申請商名稱	<input type="text"/>	標記	<input type="text"/>
製造廠名稱	<input type="text"/>	特殊氣味	<input type="text"/>
形狀	<input type="text"/>	特殊劑型	<input type="text"/>
排序方式	許可證字號	開始搜尋 重新輸入	

本查詢系統提供全文檢索功能，您只要輸入查詢關鍵詞彙，系統會自動進行資料比對，只要含有查詢詞彙的資料，皆會被搜尋出來，並顯示在畫面上。



[物外觀](#)

[許可證詳細內容](#)

[詳細處方成分](#)

[仿單/外盒資料](#)

[授權使用](#)

[離開](#)


衛署藥輸字第023623號

中文品名	普拿疼加強錠
英文品名	PANADOL EXTRA CAPLETS

藥物辨識詳細資料

外觀尺寸		特殊劑型	
顏色	白色	特殊氣味	
刻痕		形狀	長圓柱形
標記一	PANADOL, EXTRA	標記二	葛蘭素史克3

藥物辨識外觀圖片



如何查詢「不實藥物廣告」？

行政院衛生署食品藥物管理局 - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 ☆ 我的最愛

網址(D) <http://www.fda.gov.tw/> 移至

Windows Live 好友動向 個人檔案 郵件 相片 行事曆 MSN 分享 登入

公告資訊 機關介紹 業務專區 法規資訊 便民服務 出版品

業務專區

- 食品
- 藥品
- 醫療器材
- 化粧品
- 研究檢驗
- 管制藥品
- 實驗室認證
- 區管理中心

焦點新聞

2011-06-17 食品藥物管理局說明有關Baxter Healthcare (Asia) Pte. Ltd...

2011-06-16 針對美國FDA發布更新防曬產品之標示管理規定 食品藥物管理局提出說明

2011-06-15 食品安全(起雲劑含塑化劑)跨部會專案會議(第十六次)

2011-06-14 衛生署查驗大陸禾博公司薑粉含塑化劑及相關應變措施

2011-06-13 遵守「勤洗手、勿生食」原則，確保飲食安全

RSS 更多資訊

政府資訊公開

- 本局組織
- 法規資訊
- 施政計畫
- 業務統計及研究報告
- 預算及決算書
- 行政指導有關文書
- 補助案件
- 出國報告
- 書面之公共工程及採購契約

便民服務

- 為民服務信箱
- 下載專區
- 廣告申請
- 常見問答
- 學習及活動
- 問卷及民調
- 訂閱電子報
- 滿意度調查表
- 政風專欄及政風信箱

資訊查詢

- 食品
- 藥品

廣告資訊及不法藥物專區
檢舉專線 0800-285-000

進口牛肉專區
免付費諮詢專線 0800-285-000

<http://www.fda.gov.tw/>

如何查詢「不實藥物廣告」？

 行政院衛生署 食品藥物管理局 | 回首頁 | 網站地圖 | English | 雙語詞彙 | RSS | 常見問答 | 為民服務信箱 | 衛生局專區
Food and Drug Administration, Department of Health, Executive Yuan. 搜尋 [起雲劑連塑化劑污染專區](#)

公告資訊 | 機關介紹 | 業務專區 | 法規資訊 | 便民服務 | 出版品

- ▶ 不合格食品資訊
- ▶ 食品消費紅綠燈
- ▶ 藥品安全紅綠燈
- ▶ 化粧品安全紅綠燈
- ▶ 公告檢驗方法
- ▶ 不合格產品資訊
- ▶ 衛教資訊
- ▶ 電台違規廣告
- ▶ 廣告資訊及不法藥物專區

您現在的位置於 [首頁](#) > [消費者資訊](#) > [廣告資訊及不法藥物專區](#)

[友善列印](#) [轉寄好友](#)

廣告資訊及不法藥物專區 字體大小 [適中](#) [放大](#)

廣告資訊及不法藥物專區



合法廣告查詢 /LEGALITY

- 藥物化粧品廣告許可資料查詢(不包含中藥)
- 臺北市政府衛生局藥物及化粧品廣告線上查詢
- 傳播機構受理廣告注意要點.doc

媒體業者於接受藥物、化粧品廣告託播前，請先使用網頁上合法廣告查詢區塊查詢是否為本署或直轄市政府核准之廣告；若懷疑所託播之藥物、化粧品廣告為疑似違規案件，請使用網頁上違法廣告查詢區塊查詢。如確實有不明之處需洽詢時，務請業者備妥所託播廣告之「本事說明」，方可儘速協助其判定是否為政府原核准之廣告。

[廣告審查單位窗口](#)



違規廣告查詢 /ILLEGAL

- 違規藥物化粧品廣告民眾查詢系統
- 違規食品廣告資料查詢
- 電台違規廣告
- 地方衛生局違規廣告公告
- 各縣市衛生局違規食品藥物聯絡窗口
- 焦點新聞



相關連結 Links

 行政院公平交易委員會
FAIR TRADE COMMISSION, EXECUTIVE YUAN, R.O.C. (Taiwan)
[多層次傳銷資訊](#)

 行政院公平交易委員會
FAIR TRADE COMMISSION, EXECUTIVE YUAN, R.O.C. (Taiwan)
[違反公平法案件統計](#)

 國家通訊傳播委員會
National Communications Commission



其他 Other

- ▶ 各縣市衛生局網站
- ▶ 用藥安全相關知識
- ▶ 相關法規
- ▶ 食品廣告標示詞句涉及虛偽、誇張或醫藥效能之認定書

受理廣告注意要點.doc

http://www.fda.gov.tw/content.aspx?site_content_sn=1810

如何查詢「不實藥物廣告」？

行政院衛生署
違規藥物·化粧品廣告民衆查詢系統

基本查詢 最新違規列表 廣告規定案例 相關連結 使用說明

基本查詢

違規產品: (輸入關鍵字)

違規廠商: (輸入關鍵字)

查獲機關: 請選擇

刊登媒體類別: 電視 電台 平面媒體 網路 店家

處分日期: 從 到
僅供查詢一年內處分資料!

處分法條: 請選擇

處分機關: 請選擇

處分書字號: 請選擇

開始查詢

親愛的訪客 您好

相關連結

- 行政院衛生署
- 國民健康局
- 疾病管制局
- 管制藥品管理局
- 中央健康保險局
- 藥物食品檢驗局

完成 Internet

開始 Gmail - ... imo - Mi... 04 資源... 收件匣... 食品藥... 行政院... Microsoft... 下午 04:49

<http://illegal-ad.fda.gov.tw/mental/index.php>

合法藥物廣告辨識



圖片來源：youtube

藥物許可證字號

廣告核准字號

例如：

衛署藥廣字第○○○○○○○○號

北市衛藥廣字第○○○○○○○○號

高市衛藥廣字第○○○○○○○○號

正確用藥五大核心能力

五、與藥師、醫師做朋友



五、與藥師、醫師做朋友

✿ 將你常看病或領藥的藥師或醫師電話，在獲得他們許可後將諮詢電話列入通訊錄，或撥打藥袋上的諮詢電話

- ❑ 不知道怎麼用藥時
- ❑ 服藥後不舒服時
- ❑ 幫忙家人領慢性病連續處方箋時
- ❑ 買成藥時
- ❑ 有人推銷藥品時



慎用『非處方用藥』 服用前諮詢醫師藥師



美國非處方幼兒感冒咳嗽藥


服用不當後遺症：
幻覺，煩躁，中風，
心臟和呼吸系統併發症
嚴重者可能導致死亡

休閒頻道

社區藥局，您的好鄰居

❁ 找一家值得信賴的藥局

- ❁ 提供您專業且充分的用藥諮詢服務
- ❁ 減少發生重複用藥、藥物交互作用的風險
- ❁ 提供**社區藥事照護功能**：尤其是戒煙、慢性病、三高病患(糖尿病、高血壓、高血脂)等之照護
- ❁ 持慢性病連續處方箋，至社區藥局即可領藥，減少奔波之苦
- ❁



找一家值得信賴的藥局

@ 健保特約藥局的標示

@ 藥師識別證

@ 掛在牆上的藥師執照

@ 照片核對

@ 將藥師電話加入家庭
聯絡電話



藥事人員執業執照



~ 互動時刻 ~

感謝



教材製作

- ▲ 台北醫學大學附設醫院藥劑部
- ▲ 馬偕紀念醫院藥劑部
- ▲ 中華景康藥學基金會
- ▲ 振興醫療財團法人振興醫院藥劑科
- ▲ 阮綜合醫院藥劑科
- ▲ 財團法人彰化基督教醫院藥劑部
- ▲ 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院藥劑科
- ▲ 國立成功大學醫學院附設醫院藥劑部
- ▲ 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院藥劑科
- ▲ 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院

祝您
健康~

謝謝聆聽
敬請指教

Thanks a Whole Bunch

