

# 非處方藥仿單外盒換新裝

醫師藥師藥劑  
生指示藥品

乙類成藥

成藥

非處方藥指民眾可於藥局取得的藥品





為什麼要換裝呢?



提供民眾易懂的藥品資訊



內容固定位置，一目了然



增加視障者了解藥品資訊的輔助措施

# 新版仿單（說明書）樣式



## 【成分】

有效成分及含量

其他成分(賦形劑)

## 【用途(適應症)】

### 【使用上注意事項】

有下列情形者，請勿使用

有下列情形者，使用前請洽醫師診治

有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥

師藥劑生

其他使用上注意事項

### 【用法用量】

### 【警語】

服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生(以表格方式呈現)

服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

### 【包裝】

先呈現藥品使用前  
應該要知道的內容

再說明如何使用

最後再說明，使用  
後如果產生  
不舒服的症狀應該  
要如何處理

重要資訊同版面  
購買之前先閱讀

- ✓ 有效成分及含量
- ✓ 其他成分(賦形劑)
- ✓ 用途(適應症)
- ✓ 不得使用族群
- ✓ 用法用量
- ✓ 類別
- ✓ 諮詢電話



過敏錠<sup>®</sup>  
ZIMYNTYN<sup>E</sup>

藥名：靜敏錠  
有效成分及含量：Loratadine 10毫克/錠  
其他成分(賦形劑)：LACTOSE、CORN STARCH  
適應症：暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)或過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。  
不得使用族群：(一)曾經因本藥藥物引起過敏症狀者  
(二)本藥會被分泌至乳汁中，因此授乳婦不可使用  
(三)正在服用下列藥物者：  
其他的抗過敏用藥(包含皮膚病用藥、鼻爰用內服藥)及含有抗組織胺劑的內服藥等(如感冒藥、暈車藥、鎮靜安眠藥等)  
用法用量：成人及十二歲(含)以上兒童：每日一顆  
ZIMYNTYN錠劑、十二歲以下不宜自行使用。  
類別：醫師、藥師、藥劑生指示藥品  
諮詢專線：0800-000000  
衛生福利部食品藥物管理署  
台北市南港區昆陽街161-2號  
2787-8000



過敏錠<sup>®</sup>  
ZIMYNTYN<sup>E</sup>  
衛新藥製字第999999號



## 手機掃描好方便

視障或銀髮族群可透過手機掃描外盒上的QR code，將QR code中的藥品資訊解碼成文字，再用手機的應用軟體，將文字轉成語音。

品名、用途(適應症)、用法用量、藥品劑型及形狀、諮詢電話



# 換裝時程

- ❖ 已核准於電視及電影刊播廣告之非處方藥，應於105年12月31日前完成。
- ❖ 自106年1月1日起，新申請於電視及電影刊播廣告之非處方藥，應於申請廣告前完成變更。
- ❖ **108年12月31日**，所有非處方藥外盒仿單全面換裝完成

