

膠囊錠狀食品

非預期反應


食用膠囊錠狀食品後，
可能出現的非預期反應包含：



頭暈噁心



腸胃不適



心悸



過敏現象



若發生任何不適，除應盡速就醫外，也可以向「全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」通報喔！



衛生福利部
食品藥物管理署
Taiwan Food and Drug Administration



社團法人台灣食品安全促進協會
Taiwan Food Safety Promotion Association


廣告

膠囊錠狀食品與藥物 常見的交互作用



膠囊錠狀食品成分


魚油



納豆



銀杏



維他命E



蔓越莓

藥品分類與成分

✓ 抗凝血劑

Warfarin/Dabigatran/
Rivaroxban/Apixaban

✓ 抗血小板劑

Aspirin/Clopidogrel/
Ticlopidine/Ticagrelor



可能造成的反應

增加出血風險

- 不明原因瘀青
- 牙齦出血
- 深黑色糞便



膠囊錠狀食品與藥物 常見的交互作用



膠囊錠狀食品成分



藥品分類與成分

✓ 免疫抑制劑(抗排斥藥)
Corticosteroids/Methotrexate/
Azathioprine/Mycophenolate/
Cyclosporine/Tacrolimus

✓ 降血脂藥
Atorvastatin/Rosuvastatin/
Fluvastatin/Simvastatin/
Fenofibrate/Gemfibrozil

可能造成的反應

藥品成效不彰
或
導致疾病惡化

疲倦、黃疸、
肝功能指數上升、
不明原因肌肉痠痛
、茶色尿