

**105 年度「機關學校福利社與校園午餐、食材及
團膳製造業稽查抽驗專案」不合格食品風險分析(農藥)**

檢體名稱	檢出成分	檢出量 (ppm)	殘留容許量 標準(ppm)	ADI 值 (mg/kg bw)	每日容許攝 取量(mg) (體重以 60kg 成人換算)
花瓜	護汰芬	0.06	0.01	0.01	0.6
青江菜	佈飛松	2.1	1.0	0.03	1.8
蓮霧	普拔克	0.19	0.01	0.1	6.0
	安丹	0.03	0.01	0.02	1.2
大白菜	賽滅寧	1.68	1.0	0.02	1.2
柳丁	待克利	0.04	0.01	0.01	0.6
敏豆	祿芬隆	0.02	0.01	無	-
	毆蟎多	0.07	不得檢出	0.01	0.6
1. 護汰芬：對人體的影響主要為體重減輕，以及對骨骼、眼睛、肝臟的影響。 2. 佈飛松：易被人體腸胃道、皮膚、眼睛或呼吸道的吸收而造成影響，症狀輕者為頭痛、暈眩、視力模糊，嚴重者會導致呼吸困難、意識模糊、昏迷。 3. 普拔克：為一種殺菌劑。於動物試驗中發現進入體內後，於 24 小時內可將 87%的普拔克藉由尿液排出，而有 3.2%是由伴隨糞便所排出。 4. 安丹：是一種殺蟲劑。是一種殺蟲劑。在急性毒性上會有噁心、嘔吐、腹部痙攣等。可能因吸入產生視力模糊、昏睡、呼吸肌肉失調等。惟在正常飲食下，尚無危害風險。 5. 賽滅寧：為一種殺蟲劑，急性中毒的病人通常會出現消化道的症狀，如上腹部的疼痛、噁心、嘔吐；嚴重者會有抽筋、昏迷或肺水腫的情況發生。 6. 待克利：為一種殺菌劑。對於動物、植物和其他野生動物不具毒性。 7. 祿芬隆：目前無任何人體相關危害特徵資料。 8. 毆蟎多：為一種殺蟎劑，目前無任何人體相關危害特徵資料。					

**105 年度「機關學校福利社與校園午餐、食材及
團膳製造業稽查抽驗專案」不合格食品風險分析(動物用藥)**

檢體名稱	檢出成分	檢出量 (ppm)	殘留容許量 標準(ppm)	ADI 值 (mg/kg bw)	每日容許攝 取量(mg) (體重以 60kg 成人換算)
肉絲	氯黴素	0.0007	不得檢出	無	-
雞肉	替米考星	0.22	0.075	無	-
1. 氯黴素：為一廣效性的抗生素，所造成的副作用則為抑制血液系統中之骨髓造血功能，導致顆粒細胞缺乏症、再生障礙貧血症。對人體產生副作用的關係並非與劑量有絕對相關性而是與個體的敏感度有關，現已為大多數國家所禁用。 2. 替米考星：主要用於治療及控制家禽或魚類的細菌性感染。皮膚及眼睛接觸時，可能造成刺激；吸入時可能刺激黏膜及上呼吸道，惟風險低。					