仿單標籤粘貼表

105. 9. 05

產品名稱	培普鎮顆粒	申請廠商	生達化學製藥股份有限公司
衛生福利部 給證號碼	衛署藥製字 第 000706 號		

tidin Peptidin Pepti

培普鎮 顆粒

Peptidin Granules

培普鎮顆粒具有制酸、鎮痙、鎮痛及保護黏膜的作用，爲胃潰瘍治療劑。

成　　份：每公克含有：
Homatropine Methylbromide……2mg
Aluminum Magnesium Hydrate…… 400mg
Magnesium Trisilicate……300mg

作用特點：
(1)選擇性之鎮痙、鎮痛及抑制胃酸分泌作用：
本品中之主成分Homatropine Methylbromide是一種合成的副交感神經抑制劑，故具有鎮痙及抑制胃酸分泌之作用。其與Atropine不同之處爲安全範圍大(毒性僅爲Atropine之 1/30)且對胃腸有選擇性的作用，即對中樞神經影響較弱，而對胃腸道之作用特別強，故極適宜治療胃液分泌過多症及胃部痙攣性疼痛。
(2)緩衝性制酸作用：
培普鎮含有Al Mg Hydrate及Mg Trisilicate兩種緩衝性制酸劑，具有中和與吸著胃酸之作用。
1.Al Mg Hydrate:係一種以特殊方法製造之化合物，具有下列之特性：
a.迅速的制酸能力與持久的緩衝作用。
b.長時間維持胃液之pH於安全而適當的範圍內，且不受胃液Pepsin之影響。
c.不會引起鹼性過高與反動性胃酸再分泌。
d.不致影響胃腸道正常機能故服用本劑無便秘、氣脹或下痢等副作用。
e.不被胃腸吸收，無鹼性中毒或電解質失調之虞。
2.Mg Trisilicate：是一種酸之中和劑兼吸著劑與胃酸中和後形成Silicon Dioxide之含水膠狀物質，同時呈現緩衝胃液之特性。

適 應 症：胃、十二指腸潰瘍、胃酸過多、胃炎及其他需要控制胃酸之症狀。本藥須由醫師處方使用。

用法用量：通常成人1日3～4次，每次1～2公克(Gm)，飯後1～2小時及睡前或需要時服用。

注意事項:
腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

賦 形 劑：Sodium Lauryl Sulfate、Sodium Saccharin、Glycyrrhiza Extract(Licorice Extracts)、Potato Starch、Sucrose、Carboxymethylcellulose Sodium、Water Purified、Sodium Starch Glycolate、Alginate Sodium、Peppermint Oil、Orange Oil

包　　裝：1克 50、1000包膠箔盒裝，1克 300包盒裝，50、100、500克瓶裝

衛署藥製字第000706號 Code. No. GP-02 2217040

PIC/S GMP 藥廠
生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區土庫里土庫6之20號

S0501

S0412

4 713680 370405

2627042

1GmX200包

PEPTIDIN Granules

培普鎮 顆粒

PICS GMP 藥廠
生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區土庫里土庫6之20號

Lot：
Exp：

〔成　　分〕每公克含有：
Homatropine Methylbromide……2mg
Aluminum Magnesium Hydrate… 400mg
Magnesium Trisilicate……300mg
〔適 應 症〕
胃、十二指腸潰瘍、胃酸過多、胃炎、及其他需要控制胃酸之症狀。
〔用法用量〕
通常成人1日3~4次，每次1~2公克(Gm)，飯後1~2小時及睡前或需要時服用。
本藥須由醫師處方使用。
衛署藥製字第000706號

IG

成　　分：每公克含有：
Homatropine Methylbromide……2mg
Aluminum Magnesium Hydrate ……400mg
Magnesium Trisilicate ……300mg
適 應 症：胃、十二指腸潰瘍、胃酸過多、胃炎，及其他需要控制胃酸之症狀。
用法用量：通常成人1日3～4次，每次1～2公克(Gm)飯後1～2小時及睡前或需要時服用。
本藥須由醫師處方使用。
衛署藥製字第000706號

din Gr.

STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

份有限公司
里土庫6之20號