

普寧培寧膠囊

Pulinpelin Capsules

【警語】

- (一)使用含 metoclopramide 成分藥品可能造成遲發性運動障礙(tardive dyskinesia)，此為出現於臉部、舌頭及四肢非自主性的運動障礙，具有潛在的不可逆性與嚴重性。遲發性運動障礙發生之風險與使用本品治療期間與總累積劑量(total cumulative dose)有正相關性，且分析本品之使用型態，約 20%病人使用超過 12 週，故不建議長期(超過 12 週)使用本品治療，除非個案是經過評估，其治療效益高於發生 tardive dyskinesia 之風險者。
- (二)投予新生兒時應特別小心，因新生兒的清除時間較長，可能會造成血中濃度過高。且成人安全性資料不能外推至新生兒族群，使用 metoclopramide 藥品相關的不良反應如肌張力失調(dystonias)及錐體外路徑反應(extrapyramidal reactions)，於小兒族群比起成人更容易發生。

【成分】

Each capsule contains :

Metoclopramide.....5mg

【作用】

- (一)本劑含有 Metoclopramide 係消化機能異常治療劑，對胃的運動有調整作用，使其維持正常，本劑能促使胃、幽門及十二指腸之運動機能亢進，而減除胃部的停滯狀態，故對食慾不振、噁心、腹部膨滿感、嘔氣等症狀之緩和有著效。
- (二)本劑對中樞性及末梢性嘔吐均有拮抗作用，本劑對服硫酸銅引起之嘔吐及其他症狀所引起之嘔吐、噁心皆有著效。
- (三)本劑的作用有選擇性即本劑只作用於腦幹部中主司消化器官機能而不作用於中樞神經系統(CNS)循環系統及自律神經系統(ANS)故不影響胃液分泌和胃液酸度，對於胃酸過多及過少患者皆能服用。

【適應症】

預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

【用法用量】

通常成人一次服 1 至 2 粒，一日服三次，兒童依年齡酌減，請於飯前半小時服用，本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

(一)一般注意事項：

如有偶發(罕有)性間腦之內分泌機能調節異常及錐體外路症狀等副作用出現時，給藥時應充分考慮其有效性及安全性。

(二)慎重給藥：

- (1)幼兒(因易發現到錐體外路症狀請儘量注意，勿過量給藥，特別是在脫水發燒時，應予以注意)
- (2)老年人。

(三)副作用：

(1)內分泌系統：因偶發性間腦內分泌機能調節異常(gonadotropin 及 prolactin 分泌異常)致引起無月經，持續性乳汁漏出，及女性型乳房等症狀出現，故須充分診察，如確認有異常時，應立刻停止服用。(2)錐體外路症狀：由於有偶發性手指攣動直頸筋堅硬，臉

部攣縮眼球迴轉，焦躁感等症狀發作。在這些症狀出現的場合，請中止給藥，如症狀增強時應給予抗 *Parkinson* 劑適切治療，且長期服用時，偶而有嘴部等不隨意，擅動出現停止服用後會持續下去。(3)消化系統：有時會有增強胃部緊張腹痛、下痢、便秘等現象出現。(4)循環系統：偶而會出現血壓下降、脈頻、脈動不整。(5)其他：有時會有倦怠感頭痛、頭重或興奮、不安、發疹、浮腫等。

(四)孕婦之給藥：因對孕婦給藥的有關安全性，尚未確立，故對孕婦或可能懷孕之婦女之治療應先判斷其有益性及危險性。

(五)授乳婦女之給藥：本劑對新生兒的安全性尚未確立，故對授乳中的婦女之治療，應先判斷其有益性及危險性。

(六)相互作用：

(1)和下列藥物併用時，因易發生內分泌機能調節異常及錐體外路症狀，故併用這些藥物時，應仔細觀察，慎重給藥。*phenothiazine* 系製劑(*prochlorperazine, chlorpromazine Thiethylperazine* 等)。*butyrophenone* 系製劑(*Haloperidol* 等)*Rauwolfia alkaloid* 製藥。(*Reserpine* 等)。(2)本劑在 *digitalis* 劑達到飽和時會有噁心、嘔吐、食慾不振等不明顯症狀出現，對服用 *digitalis* 的患者，應仔細觀察慎重給藥。

(七)其他：有時由於會有欲眠昏眩等現象發生，故對服藥中的患者應注意停止從事駕駛汽車等危險性機械操作。

儲存條件：室溫儲存(15~30°C)。

包裝：6-1,000 粒塑膠瓶裝

藥商：聯輝藥品有限公司

地址：高雄市燕巢區安林四街 22 號

製造廠：健康化學製藥股份有限公司

地址：台中縣大甲鎮幼獅工業區幼四路 12 號

〔成份〕	衛署藥製字第000773號	【適應症】
Each capsule contains :		預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。
Metoclopramide.....5mg	普寧培寧膠囊	
	Pulinpelin Capsules	【用法用量】
批號：		通常成人一次服1至2粒，一日服三次，兒童依年齡酌減，請於飯前半小時服用。
製造日期：		本藥須由醫師處方使用
保存期限：	藥商：聯輝藥品有限公司	
	地址：高雄市燕巢區安林四街22號	
	製造廠：健康化學製藥股份有限公司	〔注意事項〕及警語
	地址：台中縣大甲鎮幼獅工業區幼四路12號	請詳閱說明書後使用

〔成份〕	衛署藥製字第000773號	【適應症】
Each capsule contains :		預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。
Metoclopramide.....5mg	普寧培寧膠囊	
	Pulinpelin Capsules	【用法用量】
批號：		通常成人一次服1至2粒，一日服三次，兒童依年齡酌減，請於飯前半小時服用。
製造日期：		本藥須由醫師處方使用
保存期限：	藥商：聯輝藥品有限公司	
	地址：高雄市燕巢區安林四街22號	
	製造廠：健康化學製藥股份有限公司	〔注意事項〕及警語
	地址：台中縣大甲鎮幼獅工業區幼四路12號	請詳閱說明書後使用