

桔梗化痰露液

(人參口味)

Platycodon Solution

本劑含有主要成分 Guaiacol Glycerin Ether(愈創木酚甘油醚)為一種藥效良好之合成鎮咳、祛痰劑，無耐性、無習慣性之中樞鎮靜作用；且能增加氣管內分泌物之排泄，發揮顯著之祛痰作用，對支氣管平滑肌具有抗痙攣作用，亦有抗組織胺作用。又本劑所含桔梗浸膏(Platycodon Extract)為桔梗科植物 Platycodon Glaucus，根部抽出之有效成分為一種刺激性之祛痰藥，此外配有遠志浸膏(Polygala Extract)，甘草浸膏(Glycyrrhiza Extract)，均為生藥中良好之鎮咳祛痰藥。本劑由于含有鎮咳祛痰作用之藥物，經服用能增加呼吸道之分泌，滋潤並緩解呼吸道之刺激，實為藥效確實之綜合性鎮咳祛痰劑。

【作用】

1. Guaiacol Glycerin Ether (愈創木酚甘油醚) 有支氣管弛緩作用，及將難於咯出的濃痰液化，使其容易咯出。
2. Glycyrrhiza Extract (甘草浸膏) 所含甘草(Glycyrrhizin)有祛痰作用。
3. Platycodon Extract (桔梗浸膏) 對咽喉等粘膜有刺激作用，使積滯於氣管和支氣管的痰液，得以容易咯出。
4. Polygala Extract (遠志浸膏) 能刺激氣管而發咳嗽，增加粘液分泌使頑痰容易咯出。

【成分】 Each ml contains :

Guaiacol Glycerin Ether	5 mg
Glycyrrhiza Extract	0.1 mg
Platycodon Extract	0.2 mg
Polygala Extract	0.05 mg

【賦形劑】

Methylparaben, Butylparaben, Potassium Sorbate, Caramel, Propylene Glycol, Alchoh, Almond Essence, Pineapple Flavor, Strawberry Flavor, Ginseng Flavor, Sucrose, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Purified Water。

【適應症】鎮咳、祛痰(支氣管炎、喉頭炎、氣管炎引起之咳嗽、咯痰)。

【用法用量】通常成人一次服用 10ml，15~7 歲服用 5ml，7~4 歲服用 3ml，4~2 歲服用 1.5ml，一日三次，飯後服用。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、高血壓、心臟病、周邊血管疾患、糖尿病及甲狀腺機能亢進之患者要小心使用。
- 四、除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
 - (一) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。
 - (二) 服用本藥時不得併服其他藥品。
- 五、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 六、使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
- 七、一般含有類交感神經興奮作用之胺類藥物，對於前列腺肥大症或青光眼之患者要小心使用。
- 八、服用本劑者應避免開車。

【警語】

- 一、吸煙、慢性阻塞性肺疾(Chronic Obstructive Pulmonary Disease，包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽、及伴有濃痰之咳嗽患者，請勿自行使用。
- 二、有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
- 三、祛痰劑宜空腹服用。

【副作用】

輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。

【包裝規格】10 ~ 4000 公撮瓶裝

衛署藥製字第 000884 號

製造廠：長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

委託者：健民藥品社
彰化縣伸港鄉新港村新港路 158 巷 29-1 號

桔梗化痰露液

(梅子口味)

Platycodon Solution

本劑含有主要成分 Guaiacol Glycerin Ether(愈創木酚甘油醚)為一種藥效良好之合成鎮咳、祛痰劑，無耐性、無習慣性之中樞鎮靜作用；且能增加氣管內分泌物之排泄，發揮顯著之祛痰作用，對支氣管平滑肌具有抗痙攣作用，亦有抗組織胺作用。又本劑所含桔梗浸膏(Platycodon Extract)為桔梗科植物 Platycodon Glaucus，根部抽出之有效成分為一種刺激性之祛痰藥，此外配有遠志浸膏(Polygala Extract)，甘草浸膏(Glycyrrhiza Extract)，均為生藥中良好之鎮咳祛痰藥。本劑由于含有鎮咳祛痰作用之藥物，經服用能增加呼吸道之分泌，滋潤並緩解呼吸道之刺激，實為藥效確實之綜合性鎮咳祛痰劑。

【作用】

1. Guaiacol Glycerin Ether (愈創木酚甘油醚) 有支氣管弛緩作用，及將難於咯出的濃痰液化，使其容易咯出。
2. Glycyrrhiza Extract (甘草浸膏) 所含甘草(Glycyrrhizin)有祛痰作用。
3. Platycodon Extract (桔梗浸膏) 對咽頭等粘膜有刺激作用，使積滯於氣管和支氣管的痰液，得以容易咯出。
4. Polygala Extract (遠志浸膏) 能刺激氣管而發咳嗽，增加粘液分泌使頑痰容易咯出。

【成分】 Each ml contains :

Guaiacol Glycerin Ether	5 mg
Glycyrrhiza Extract	0.1 mg
Platycodon Extract	0.2 mg
Polygala Extract	0.05 mg

【賦形劑】

Methylparaben, Butylparaben, Potassium Sorbate, Caramel, Propylene Glycol, Alchoh, Almond Essence, Pineapple Flavor, Strawberry Flavor, Prune Flavour, Sucrose, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Purified Water。

【適應症】鎮咳、祛痰(支氣管炎、喉頭炎、氣管炎引起之咳嗽、咯痰)。

【用法用量】通常成人一次服用 10ml，15~7 歲服用 5ml，7~4 歲服用 3ml，4~2 歲服用 1.5ml，一日三次，飯後服用。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、高血壓、心臟病、周邊血管疾患、糖尿病及甲狀腺機能亢進之患者要小心使用。
- 四、除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
 - (一) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。
 - (二) 服用本藥時不得併服其他藥品。
- 五、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 六、使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
- 七、一般含有類交感神經興奮作用之胺類藥物，對於前列腺肥大症或青光眼之患者要小心使用。
- 八、服用本劑者應避免開車。

【警語】

- 一、吸煙、慢性阻塞性肺疾(Chronic Obstructive Pulmonary Disease，包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽、及伴有濃痰之咳嗽患者，請勿自行使用。
- 二、有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
- 三、祛痰劑宜空腹服用。

【副作用】

輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。

【包裝規格】10 ~ 4000 公撮瓶裝

衛署藥製字第 000884 號

製造廠：長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

委託者：健民藥品社
彰化縣伸港鄉新港村新港路 158 巷 29-1 號

桔梗化痰露液

(桂皮口味)

Platycodon Solution

本劑含有主要成分 Guaiacol Glycerin Ether(愈創木酚甘油醚)為一種藥效良好之合成鎮咳、祛痰劑，無耐性、無習慣性之中樞鎮靜作用；且能增加氣管內分泌物之排泄，發揮顯著之祛痰作用，對支氣管平滑肌具有抗痙攣作用，亦有抗組織胺作用。又本劑所含桔梗浸膏(Platycodon Extract)為桔梗科植物 Platycodon Glaucus，根部抽出之有效成分為一種刺激性之祛痰藥，此外配有遠志浸膏(Polygala Extract)，甘草浸膏(Glycyrrhiza Extract)，均為生藥中良好之鎮咳祛痰藥。本劑由于含有鎮咳祛痰作用之藥物，經服用能增加呼吸道之分泌，滋潤並緩解呼吸道之刺激，實為藥效確實之綜合性鎮咳祛痰劑。

【作用】

1. Guaiacol Glycerin Ether (愈創木酚甘油醚) 有支氣管弛緩作用，及將難於咯出的濃痰液化，使其容易咯出。
2. Glycyrrhiza Extract (甘草浸膏) 所含甘草(Glycyrrhizin)有祛痰作用。
3. Platycodon Extract (桔梗浸膏) 對咽頭等粘膜有刺激作用，使積滯於氣管和支氣管的痰液，得以容易咯出。
4. Polygala Extract (遠志浸膏) 能刺激氣管而發咳嗽，增加粘液分泌使頑痰容易咯出。

【成分】 Each ml contains :

Guaiacol Glycerin Ether	5 mg
Glycyrrhiza Extract	0.1 mg
Platycodon Extract	0.2 mg
Polygala Extract	0.05 mg

【賦形劑】

Methylparaben, Butylparaben, Potassium Sorbate, Caramel, Propylene Glycol, Alchoh, Almond Essence, Pineapple Flavor, Strawberry Flavor, Cinnamic Aldehyde, Sucrose, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Purified Water。

【適應症】鎮咳、祛痰(支氣管炎、喉頭炎、氣管炎引起之咳嗽、咯痰)。

【用法用量】通常成人一次服用 10ml，15~7 歲服用 5ml，7~4 歲服用 3ml，4~2 歲服用 1.5ml，一日三次，飯後服用。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、高血壓、心臟病、周邊血管疾患、糖尿病及甲狀腺機能亢進之患者要小心使用。
- 四、除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
 - (一) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。
 - (二) 服用本藥時不得併服其他藥品。
- 五、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 六、使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
- 七、一般含有類交感神經興奮作用之胺類藥物，對於前列腺肥大症或青光眼之患者要小心使用。
- 八、服用本劑者應避免開車。

【警語】

- 一、吸煙、慢性阻塞性肺疾(Chronic Obstructive Pulmonary Disease，包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽、及伴有濃痰之咳嗽患者，請勿自行使用。
- 二、有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
- 三、祛痰劑宜空腹服用。

【副作用】

輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。

【包裝規格】10 ~ 4000 公撮瓶裝

衛署藥製字第 000884 號

製造廠：長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

委託者：健民藥品社
彰化縣伸港鄉新港村新港路 158 巷 29-1 號

桔梗化痰露液

(香蕉口味)

Platycodon Solution

本劑含有主要成分 Guaiacol Glycerin Ether(愈創木酚甘油醚)為一種藥效良好之合成鎮咳、祛痰劑，無耐性、無習慣性之中樞鎮靜作用；且能增加氣管內分泌物之排泄，發揮顯著之祛痰作用，對支氣管平滑肌具有抗痙攣作用，亦有抗組織胺作用。又本劑所含桔梗浸膏(Platycodon Extract)為桔梗科植物 Platycodon Glaucus，根部抽出之有效成分為一種刺激性之祛痰藥，此外配有遠志浸膏(Polygala Extract)，甘草浸膏(Glycyrrhiza Extract)，均為生藥中良好之鎮咳祛痰藥。本劑由于含有鎮咳祛痰作用之藥物，經服用能增加呼吸道之分泌，滋潤並緩解呼吸道之刺激，實為藥效確實之綜合性鎮咳祛痰劑。

【作用】

1. Guaiacol Glycerin Ether (愈創木酚甘油醚) 有支氣管弛緩作用，及將難於咯出的濃痰液化，使其容易咯出。
2. Glycyrrhiza Extract (甘草浸膏) 所含甘草(Glycyrrhizin)有祛痰作用。
3. Platycodon Extract (桔梗浸膏) 對咽喉等粘膜有刺激作用，使積滯於氣管和支氣管的痰液，得以容易咯出。
4. Polygala Extract (遠志浸膏) 能刺激氣管而發咳嗽，增加粘液分泌使頑痰容易咯出。

【成分】 Each ml contains :

Guaiacol Glycerin Ether	5 mg
Glycyrrhiza Extract	0.1 mg
Platycodon Extract	0.2 mg
Polygala Extract	0.05 mg

【賦形劑】

Methylparaben, Butylparaben, Potassium Sorbate, Caramel, Propylene Glycol, Alcohol, Almond Essence, Pineapple Flavor, Strawberry Flavor, Artificial Banana Flavour, Sucrose, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Purified Water.

【適應症】鎮咳、祛痰(支氣管炎、喉頭炎、氣管炎引起之咳嗽、咯痰)。

【用法用量】通常成人一次服用 10ml，15~7 歲服用 5ml，7~4 歲服用 3ml，4~2 歲服用 1.5ml，一日三次，飯後服用。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、高血壓、心臟病、周邊血管疾患、糖尿病及甲狀腺機能亢進之患者要小心使用。
- 四、除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
 - (一) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。
 - (二) 服用本藥時不得併服其他藥品。
- 五、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 六、使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
- 七、一般含有類交感神經興奮作用之胺類藥物，對於前列腺肥大症或青光眼之患者要小心使用。
- 八、服用本劑者應避免開車。

【警語】

- 一、吸煙、慢性阻塞性肺疾(Chronic Obstructive Pulmonary Disease，包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽、及伴有濃痰之咳嗽患者，請勿自行使用。
- 二、有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
- 三、祛痰劑宜空腹服用。

【副作用】

輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。

【包裝規格】10 ~ 4000 公撮瓶裝

衛署藥製字第 000884 號

製造廠：長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

委託者：健民藥品社
彰化縣伸港鄉新港村新港路 158 巷 29-1 號

桔梗化痰露液

Platycodon Solution

(葡萄口味)

本劑含有主要成分 Guaiacol Glycerin Ether(愈創木酚甘油醚)為一種藥效良好之合成鎮咳、祛痰劑，無耐性、無習慣性之中樞鎮靜作用；且能增加氣管內分泌物之排泄，發揮顯著之祛痰作用，對支氣管平滑肌具有抗痙攣作用，亦有抗組織胺作用。又本劑所含桔梗浸膏(Platycodon Extract)為桔梗科植物 Platycodon Glaucus，根部抽出之有效成分為一種刺激性之祛痰藥，此外配有遠志浸膏(Polygala Extract)，甘草浸膏(Glycyrrhiza Extract)，均為生藥中良好之鎮咳祛痰藥。本劑由于含有鎮咳祛痰作用之藥物，經服用能增加呼吸道之分泌，滋潤並緩解呼吸道之刺激，實為藥效確實之綜合性鎮咳祛痰劑。

【作用】

1. Guaiacol Glycerin Ether (愈創木酚甘油醚) 有支氣管弛緩作用，及將難於咯出的濃痰液化，使其容易咯出。
2. Glycyrrhiza Extract (甘草浸膏) 所含甘草(Glycyrrhizin)有祛痰作用。
3. Platycodon Extract (桔梗浸膏) 對咽頭等粘膜有刺激作用，使積滯於氣管和支氣管的痰液，得以容易咯出。
4. Polygala Extract (遠志浸膏) 能刺激氣管而發咳嗽，增加粘液分泌使頑痰容易咯出。

【成分】 Each ml contains :

Guaiacol Glycerin Ether	5 mg
Glycyrrhiza Extract	0.1 mg
Platycodon Extract	0.2 mg
Polygala Extract	0.05 mg

【賦形劑】

Methylparaben, Butylparaben, Potassium Sorbate, Caramel, Propylene Glycol, Alchoh, Almond Essence, Pineapple Flavor, Strawberry Flavor, Grape Flavour, Sucrose, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Purified Water。

【適應症】鎮咳、祛痰(支氣管炎、喉頭炎、氣管炎引起之咳嗽、咯痰)。

【用法用量】通常成人一次服用 10ml，15~7 歲服用 5ml，7~4 歲服用 3ml，4~2 歲服用 1.5ml，一日三次，飯後服用。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、高血壓、心臟病、周邊血管疾患、糖尿病及甲狀腺機能亢進之患者要小心使用。
- 四、除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
 - (一) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。
 - (二) 服用本藥時不得併服其他藥品。
- 五、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 六、使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
- 七、一般含有類交感神經興奮作用之胺類藥物，對於前列腺肥大症或青光眼之患者要小心使用。
- 八、服用本劑者應避免開車。

【警語】

- 一、吸煙、慢性阻塞性肺疾(Chronic Obstructive Pulmonary Disease，包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽、及伴有濃痰之咳嗽患者，請勿自行使用。
- 二、有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
- 三、祛痰劑宜空腹服用。

【副作用】

輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。

【包裝規格】10 ~ 4000 公撮瓶裝

衛署藥製字第 000884 號

製造廠：長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

委託者：健民藥品社
彰化縣伸港鄉新港村新港路 158 巷 29-1 號

桔梗化痰露液

(甜橙口味)

Platycodon Solution

本劑含有主要成分 Guaiacol Glycerin Ether(愈創木酚甘油醚)為一種藥效良好之合成鎮咳、祛痰劑，無耐性、無習慣性之中樞鎮靜作用；且能增加氣管內分泌物之排泄，發揮顯著之祛痰作用，對支氣管平滑肌具有抗痙攣作用，亦有抗組織胺作用。又本劑所含桔梗浸膏(Platycodon Extract)為桔梗科植物 Platycodon Glaucus，根部抽出之有效成分為一種刺激性之祛痰藥，此外配有遠志浸膏(Polygala Extract)，甘草浸膏(Glycyrrhiza Extract)，均為生藥中良好之鎮咳祛痰藥。本劑由于含有鎮咳祛痰作用之藥物，經服用能增加呼吸道之分泌，滋潤並緩解呼吸道之刺激，實為藥效確實之綜合性鎮咳祛痰劑。

【作用】

1. Guaiacol Glycerin Ether (愈創木酚甘油醚) 有支氣管弛緩作用，及將難於咯出的濃痰液化，使其容易咯出。
2. Glycyrrhiza Extract (甘草浸膏) 所含甘草(Glycyrrhizin)有祛痰作用。
3. Platycodon Extract (桔梗浸膏) 對咽頭等粘膜有刺激作用，使積滯於氣管和支氣管的痰液，得以容易咯出。
4. Polygala Extract (遠志浸膏) 能刺激氣管而發咳嗽，增加粘液分泌使頑痰容易咯出。

【成分】 Each ml contains :

Guaiacol Glycerin Ether	5 mg
Glycyrrhiza Extract	0.1 mg
Platycodon Extract	0.2 mg
Polygala Extract	0.05 mg

【賦形劑】

Methylparaben, Butylparaben, Potassium Sorbate, Caramel, Propylene Glycol, Alchoh, Almond Essence, Pineapple Flavor, Strawberry Flavor, Orange Flavor, Sucrose, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Purified Water。

【適應症】鎮咳、祛痰(支氣管炎、喉頭炎、氣管炎引起之咳嗽、咯痰)。

【用法用量】通常成人一次服用 10ml，15~7 歲服用 5ml，7~4 歲服用 3ml，4~2 歲服用 1.5ml，一日三次，飯後服用。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、高血壓、心臟病、周邊血管疾患、糖尿病及甲狀腺機能亢進之患者要小心使用。
- 四、除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
 - (一) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。
 - (二) 服用本藥時不得併服其他藥品。
- 五、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 六、使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
- 七、一般含有類交感神經興奮作用之胺類藥物，對於前列腺肥大症或青光眼之患者要小心使用。
- 八、服用本劑者應避免開車。

【警語】

- 一、吸煙、慢性阻塞性肺疾(Chronic Obstructive Pulmonary Disease，包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽、及伴有濃痰之咳嗽患者，請勿自行使用。
- 二、有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
- 三、祛痰劑宜空腹服用。

【副作用】

輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。

【包裝規格】10 ~ 4000 公撮瓶裝

衛署藥製字第 000884 號

製造廠：長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號

委託者：健民藥品社
彰化縣伸港鄉新港村新港路 158 巷 29-1 號