

“應元” 益眼乙₁₂ 眼藥水

Ei Yen B₁₂ Eye Drops “Y.Y.”

【成分】 每毫升含有：

有效成分及含量：

Sodium Chondroitin Sulfate.....3mg
Cyanocobalamin (Vitamin B₁₂).....50mcg
Pyridoxine HCl.....1mg
Chlorpheniramine Maleate.....0.1mg

其他成分(賦形劑)：

Chlorobutanol, Methylparaben, Propylparaben, Sodium Chloride, Sodium Borate Decahydrate, Menthol, Borneol, Water for Injection, D-Pantothenyl Alcohol。

【用途(適應症)】

結膜炎、角膜炎、眼睛疲勞、淚囊炎、麥粒腫、紫外線及其他光線引起之眼炎。

【使用上注意事項】

1. 有下列情形者，請勿使用
 - 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 有下列情形者，使用前請洽醫生診治
 - 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者。
3. 其他使用上注意事項
 - (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (2) 避免陽光直射。
 - (3) 使用前，請洗淨雙手。
 - (4) 請依照藥品標示使用。
 - (5) 以下情形，請勿繼續使用。
 1. 超過保存期限的眼藥水。
 2. 開瓶 28 天後。
 3. 藥液混濁、變色或出現異物時。
 - (6) 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
 - (7) 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
 1. 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔 10 分鐘以上再用藥膏。
 2. 使用兩種眼藥水時，建議間隔 5 分鐘以上。
 - (8) 配戴隱形眼鏡時，請勿使用含防腐劑及含懸浮液之眼藥水。

【用法用量】

一日 2 至 3 次 每次 2 至 3 滴，臨睡前再點一次。

【警語】

1. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 - (1) 連續使用三天(或 72 小時) 症狀沒有改善。
 - (2) 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
 - (3) 若有任何不適情況產生。發生過敏反應。

【包裝】 100 毫升以下塑膠瓶裝。

【貯存】

1. 請置於 30℃ 以下貯存。
2. 使用後將塑膠蓋密封，於冷暗處貯藏。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品



應元化學製藥股份有限公司

台灣台南市安平工業區新忠路 26 號 TEL: (06) 2654883 (代表號)