"理想" 拿咳膠囊
Naco Capsules “ideal”

衛署藥製字第02151號

【成 分】：Each capsule contains:
Cloperastine HCL.....20 mg
dl-Methylephedrine HCl.....16.6 mg
Potassium Guaiacolsulfonate.....80 mg
Chlorpheniramine maleate ……..2.5mg
【賦形劑】Calcium carbonate、Starch
【適 應 症】：緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、咯痰)。
【用法用量】：一日3次。成人每次1粒，12歲以上，適用成人劑量。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】：
一.為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
二.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
三.除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
(一)孕婦及授乳婦不建議自行使用。
(二)服用本藥時不得併服其他藥品。
四.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
五.本藥不得併服含酒精飲料。
【警 語】：一.服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
二.除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
(一)6歲以下不建議自行使用。
(二)曾經因本藥引起過敏症狀者不得服用。
三.患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。
四.除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。
五.若咳嗽持續一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
衛
六.吸菸、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
七.不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
八.不要服用本藥超過七日。
九.服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還伴隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
十.服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
十一.本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項:
(一)服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
(二)除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥:青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
十二.本藥含支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。

【包 裝】：6-1000粒瓶裝。
【儲 存】：室溫(15-30℃)儲存。

委 託 者：理想藥品股份有限公司
地址:台北市中山區長安東路 2 段 171 號 2 樓之 2
電 話：02-26558167
製 造 廠：健康化學製藥股份有限公司
地址:台中縣大甲鎮幼獅工業區幼四路 12 號

"理想" 拿咳膠囊
Naco Capsules “ideal”

衛衛署藥製字第02151號

【成 分】：Each capsule contains:
Cloperastine HCL.....20 mg
dl-Methylephedrine HCl.....16.6 mg
Potassium Guaiacolsulfonate.....80 mg
Chlorpheniramine maleate ……..2.5mg
【賦形劑】Calcium carbonate、Starch
【適 應 症】緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)。
【用法用量】：請詳閱說明書。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

委　託　者：理想藥品股份有限公司
地址台北市中山區長安東路 2 段 171 號 2 樓之 2
電　　話：02-26558167
製　造　廠：健康化學製藥股份有限公司
地 址：台中縣大甲鎮幼獅工業區幼四路 12 號