衛署藥製字第002242號
Code：2302

"井田"

委適朗 錠

UNSULON Tablets "Chinteng"


Quinolone類藥品可能與肢體障礙及潛在不可逆嚴重不良反應之發生相關，包括肌腱炎、肌腱斷裂、周邊神經炎及中樞神經系統作用。

委適朗錠所含成分Nalidixic acid係Naphthyridine類衍生物，其對革蘭氏陰性菌具有強力阻止增殖作用。

【成　　份】：每錠含(Each Tab Contains)：

Nalidixic acid	500mg
Starch	78mg
Lactose	120mg
Magnesium stearate	2mg

化學結構如下：



1-Ethy1-1，4-dihydro-7-methy1-4-oxo-1，8-naph-thyridine-3-carboxylic acid.

$C_{12}H_{12}N_2O_3$

【賦 形 劑】：Lactose、Corn Starch、Povidone、Potato Starch、Tartrazine Aluminum Lake、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate、Sodium Lauryl Sulfate.

【適 應 症】：革蘭氏陰性菌所引起之感染症、細菌性痢疾、急慢性腸炎、急慢性尿路感染症(腎盂炎、尿管炎、膀胱炎、尿道炎)、膽道感染症(膽囊炎、膽管炎)。

【用法用量】：成人一日4-6錠，分3-4次服用。幼兒以一日量50mg/kg體重給藥。

本藥須由醫師處方使用

【注意事項】：

1. 本劑不適用於早產兒及未滿月之嬰兒。
2. 本劑不影響碳水化合物之新陳代謝，惟服用本劑時，因其在體內部份與醛酸醣(glucuronic acid)結合排於尿中，會使得若干以還原作用檢查尿中醣含量之方法發生錯誤，故服用本劑期間，應採用試紙法如：Clinistix，Tes-Tape等檢驗之。

【警語及注意事項】：

1.過去使用quinolone或fluoroquinolone類藥品曾發生嚴重不良反應的病人，應避免使用本藥。

2.肌腱炎及肌腱斷裂

肌腱炎及肌腱斷裂(好發於阿基里斯腱)，有時為雙側，可能在開始使用quinolone類藥品的48小時內很快發生，也可能甚至在停藥數個月後才發生。老年人、腎功能不良、曾進行器官移植或同時併用皮質類固醇的病人會增加肌腱炎及肌腱斷裂的風險，故使用本藥應避免併用皮質類固醇。

當出現肌腱炎的初期徵兆(如疼痛腫脹、發炎)，應停用本藥並考慮使用替代藥物。受到影響的肢體應加以適當的治療(如加以固定)。

倘出現肌腱病變的徵兆應避免使用皮質類固醇。

3.中樞神經系統作用：

(1)精神相關不良反應

Quinolone類藥品可能增加精神相關不良反應，包括中毒性精神病、精神病反應進展至自殺意念/想法、幻覺或妄想；憂鬱或自殘行為如企圖自殺或完成自殺；焦慮、躁動或緊張；精神混亂、瞻妄、失去方向感或注意力無法集中；失眠或做惡夢；記憶力受損。這些反應可能發生在第一次投藥後。建議使用本藥之病人倘出現前述不良反應，應立即告知醫療人員，停用此藥並開始適當的治療。

(2)中樞神經系統不良反應

Quinolone類藥品可能與增加癲癇(痙攣)風險、增加顱內壓(假性腦腫瘤)、頭暈和顫抖有關。此類藥物已知會誘發癲癇或降低癲癇閾值。曾有癲癇重積狀態的通報案例。應小心使用於癲癇病人及已知或疑似患有可能會誘發癲癇或降低癲癇閾值之中樞神經疾病(如嚴重腦動脈硬化、有痙攣病史、腦部血流減少、腦部結構改變或中風)，或具其他可能會誘發癲癇或降低癲癇閾值危險因子(如藥物、腎功能不全)的病人，如發生癲癇應停用本藥並開始適當的治療。

4.血糖異常

Quinolone類藥品可能與血糖異常有關，包括有症狀的高血糖和低血糖，通常發生於同時使用口服降血糖藥物(如glyburide)或胰島素之糖尿病病人建議針對這些病人要小心監控血糖值。

曾有嚴重低血糖導致昏迷或死亡的通報案例。如使用本藥之病人發生低血糖反應，應停用本藥並立即開始適當的治療。

【包　　裝】8~1000錠，塑膠瓶裝。

PIC/S G.M.P. 認證&國際ISO 9001驗證&中日合作廠

井田國際醫藥廠股份有限公司

CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.

台灣台中市大甲幼獅工業區幼獅路32號

PIC/S G.M.P.　TEL：(04)26814585-7(三線)

諮詢專線：(0800)461461