

廣效性抗生素製劑

“東洲” 克耐黴素 注射液

KANAMYCIN Injection “Oriental”

本劑為Kanamycin Sulfate之水溶液中加入適當之緩衝劑，安定劑，抑菌劑而製成之安定性製劑，於使用上較為方便。

【組 成】本劑每ml含有

Kanamycin Sulfate.....250mg. (potency)

賦形劑: Sodium citrate, Sodium Bisulfite, Rongalite,
Methyl paraben, Propyl paraben, Water for injection.

【作用與特長】

- (1)本劑對於格蘭氏陽性菌及陰性菌及結核桿菌皆顯示強力阻止發育作用。
- (2)本劑與日常使用之其他抗生物質無交叉耐性現象，對於他種抗生素已具耐性之葡萄球菌、大腸菌、赤痢菌，皆具優異療效。
- (3)對於鏈黴素，PAS, INAH 獲有耐性之結核桿菌，應用本劑，亦可得良好療效。
- (4)對於難於治療之綠膿菌，變形菌等引起之感染症，亦可發揮優良療效。
- (5)本劑極安定，於室溫下保存8個月，力價不見減低又於100°C加熱1小時，力價亦不見減低於PH 4.0-8.0內極為安定。
- (6)肌肉注射後，吸收迅速，於1小時後呈現最高之血中濃度，分佈於各臟器，主要由腎臟排泄。
- (7)葡萄球菌、肺炎球菌、綠膿菌、流行性感冒桿菌引起之氣道感染症如咽頭炎、支氣管炎、扁桃腺炎、肺炎。
- (8)葡萄球菌、大腸菌、綠膿菌引起之尿路感染症，如膀胱炎、腎盂炎、尿道炎。
- (9)淋菌感染症。
- (10)葡萄球菌、肺炎球菌、綠膿菌引起之一般化膿性疾患：骨髓炎。
- (11)肺結核、泌尿器結核、性器結核。

【適應症】

結核症、咽頭炎、扁桃腺炎、支氣管炎、肺炎、膀胱炎、腎盂炎、尿道炎、淋病、骨髓炎。

【用法・用量】

成人1日4-8ml. (1-2gm.力價)，分為1-2次行肌肉注射(臀部上部外側肌、大腿肌、三角肌等)深部注射。

小兒每公斤體重每日30-50mg. (力價)，分為1-2次肌肉注射。

結核患者，以本劑治療時，請併用PAS, INH等抗結核劑，以達到更為迅速之療效。

下列各劑量為供治療結核患者之參考。

- (1)通常1日8ml (2gm.)，早、晚各4ml.，每星期使用2日。
- (2)有發熱或其他一般症狀顯著之重症者，最初每日1 gm，每日使用，待症狀好轉後再用(1)之方法治療。
- (3)輕症者，每日1 gm力價，每週使用2-3日。

【本藥限由醫師使用】

【注意事項】

- (1)使用本劑時，極少數人會有耳鳴、眩暈等第八腦神經之障礙發生，須十分小心觀察，如有發現此種症狀，請停止用藥。
- (2)連續使用本藥時，總量請勿超過40克或8天。
- (3)有腎臟障礙之患者，請勿使用。
- (4)使用本劑時，有極少數人會有一過性之頭暈或口唇麻木等症狀。
- (5)對於本劑有過敏性患者，請勿使用。
- (6)本劑盡量避免與其他藥劑混合注射。
- (7)連續使用時，請盡可能變更注射部位。

【包裝】

4ml, 10ml, 20ml/Vial, 100 支以下盒裝。



東洲化學製藥廠股份有限公司
ORIENTAL CHEMICAL WORKS INC.

新北市蘆洲區中山二路195巷12號
電話:(02)2281-5252 傳真:(02)2281-8282