【仿單-背面】W 95 mm × H 175 mm

(六)單次劑量(2 錠)之酸中和能力為 28mEq，鎂含量為 11.44mEq。

【用法用量】

年齡	使用量
成人及 12 歲以上	一天 3 至 4 次或需要時服用，應嚼碎後吞服，每次 2 錠。
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人使用量之 1/2 (每次 1 錠)。
3 歲以上未滿 6 歲	適用成人使用量之 1/4 (每次 1/2 錠)。
3 歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有任何不適情況產生。

(二)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】12～1000 錠塑膠瓶裝、膠箔盒裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲藏條件】請貯存於 25℃以下之陰涼處，且於期限內使用。

LT-T040

福元化學製藥股份有限公司
新北市瑞芳區大寮路 95-1 號