

衛署藥製字第02962號

“大豐” 普 怡 錠  
PREIN Tablets "T.F."

過去在儂麻質斯樣關節炎膠原性Allergy疾病等多種病症中所用的Cortisone與Hydrocortisone雖然很有效，但長期服用後，常有浮腫，心機能不健全等嚴重副作用發生，因此不能長期連續使用，現本公司出品之去氫化腎上腺皮質素錠片(Prednisolone Tab)以Hydrocortisone之第一碳和第二碳間之脫氫生成物Prednisolone為主要成分比Cortisone具有更強的功效，副作用則比Cortisone輕微，可供長期治療之用。

【成 分】每錠中含：

Prednisolone.....5mg

【賦 形 劑】

Erythrosine(FD&C Red No.3), Povidone(K-30), Magnesium Stearate, Talc, Lactose (Milk sugar), Starch, Calcium Carboxymethylcellulose, Cochineal red A。

【適 應 症】

- ① 支氣管氣喘及過敏性疾患。
- ② 風濕性疾患。

【用法用量】

本劑一日之服用量為食後及就寢前4次或朝夕2次服用，症狀好轉後每隔2~3天服用量，1日各減量 $\frac{1}{2}$ 片-1片(2.5mg~5mg)作維持療法，若萬一再發現時漸次增量而抑制症狀。以下所示之用法用量係適應於各種疾患及其症狀，輕重加以適量增減使用。

初期服用量(抑制量)(重症1日6片(30mg)，其他1日4片(20mg)普通本劑治療開始後3~4日症狀，即可好轉若繼續初期服用量，7日內仍不見效果時應懷疑該症狀是否真為風濕性關節炎。

- ① 症狀好轉後將服用量每隔2~3日減少 $\frac{1}{2}$ 片(2.5mg)至適當量後為維持量，必要時，與安靜療法，食餽療法，整形外科的療法等，過去之治療合併也無妨。
- ② 風濕熱、風濕性心炎、骨關節炎、痛風等風濕性疾患，使用法與風濕性關節炎之使用法完全相同，視症狀之輕重服用有效之最低量。
- ③ 支氣管氣喘症：服用風濕性關節炎治療，略同量為抑制量，普通症狀於12~24小時內即可好轉，但如喘息發作停止後不可立即停藥，應將服用量日各減少 $\frac{1}{2}$ ~1片(2.5~5mg)改為維持治療法，治療開始後3~4日呼吸困難會消失，肺活量亦有顯著之增加。
- ④ 播種性後斑性狼瘡性膠原病。一般皮膚炎疾患，需要大量服用，初期抑制量，普通使用1日6片(30mg)以上。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- ① 急慢性感染症使用時併同適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。
- ② 對消化器官障礙如胃腸潰瘍須特別注意。
- ③ 因主要副作用引起浮腫，血壓上升是以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
- ④ 糖尿病患者使用時有增加insulin藥量的必要請注意。
- ⑤ 對於有精神病因素者多加注意。
- ⑥ 服用本劑期間請充分補充蛋白質。

【絕對禁忌】

精神病、消化管潰瘍、抗生物質不能奏效之須要手術之感染性疾患。

【比較禁忌】

心臟血管障礙、腎機能不全、糖尿病、閉塞性靜脈炎、骨粗鬆病、痙攣性疾病、結核病。

【包 裝】100、500、1000粒瓶裝

(GMP藥廠)

 大豐製藥股份有限公司  
公司・工廠：彰化市延平里岸頭巷11號

檔號：104.820誠-11T