蛋白同化促進劑

PYT-002
衛署藥製字第004696號

YSP

"永信"

蛋白力® 糖衣錠

Proteiny® S.C. Tablets "Yung Shin"

本藥主成分-Methandrostenolone，係爲一種合成性雄性荷爾蒙，其所具有之蛋白同化效應要比其雄性化作用更爲顯著，故常爲臨床應用於耗弱體質及當骨質疏鬆引起疼痛時之治療。

【成　　分】每錠中含：

Methandrostenolone ····· 5mg

【賦 形 劑】

Lactose、Potato Starch、Sodium Lauryl Sulfate、Magnesium stearate、Talc、Calcium Carboxymethylcellose、Hydroxypropylmethylcellulose、Dimethylpolysiloxane、Sucrose、Calcium Phosphate Dibasic 2H2O、Acasia、Titanium Dioxide、Gelatin、Colloidal Silicon Dioxide、Brilliant Blue FCF、Tartrazine。

【作　　用】

1. 本藥可促進蛋白之合成而呈現顯著之蛋白同化作用和氮平衡之陽性化，故可促進身體組織蛋白之蓄存。
2. 本藥可改善體內鈣質之平衡，並促進骨骼鈣質之沈積及骨細胞間質之形成，因此對骨疏鬆症具有良好之治療效果。

【適 應 症】

骨骼疏鬆症(Osteoporosis)、男性性腺機能不足症(Hypogonadism)、手術後、外傷、熱傷、慢性腎臟疾病引起之體質極度消耗、再生不良性貧血引起之骨髓消耗狀態。

【用法·用量】

通常成人一日量爲5mg，分1～3次服用。
本藥須由醫師處方使用。

【禁 忌 症】

當對本藥產生過敏反應之患者禁用本藥。

【一 般 注 意】

1. 使用前應權衡其利弊，如另有代替使用之藥品，則應避免使用本藥。
2. 本藥宜避免大劑量或長期使用。
3. 對於前列腺肥大、心臟、腎臟疾病患者、癌的骨轉移患者、高齡者、鈉或體液滯留、高鈣血症者及糖尿病患者應慎重投藥。肝機能障害者也應禁用本藥。
4. 服用本藥會有黃疸現象，將導致GOT、GPT之上昇，長期投藥應做定期肝功能檢查，若發現有異常者，即停止給藥。
5. 如有下列症狀出現時，應立即中止投藥(女性：聲音低沉、多毛、色素沉著、月經異常、陰核肥大、性慾亢進。(男性：痤瘡、陰莖肥大、陽萎、持續性勃起及精子減少、精液減少等睪丸機能抑制現象。
6. 有過敏現象時應立即中止給藥。

【孕婦、授乳婦之投與】

孕婦長期服用該藥可能導致女性胎兒男性化，故已懷孕或可能懷孕婦女應避免使用。

【新生兒、乳兒之投與】

對小兒會引起骨骼之早期閉鎖(Premature closure of the epiphyses)及性早熟等現象，故應慎重投與，且十二歲以下小孩應避免使用。

【使用後之注意】

本藥服用後，若發生過敏或不適現象（如發疹、搔癢等），請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副 作 用】

服用本藥會導致噁心、嘔吐、食慾不振、便秘、下痢等胃腸障害以及頭痛、頭暈、興奮、不眠之精神神經系統障礙。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

YUNGSHIN®

永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電　　話：（04）26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2141744