

160x195mm

鎮咳、祛痰劑  
“久松”嗽友液

SAUYOU LIGUID "C.S."

衛署藥製字第005974號

依近代藥學上已闡明，藥物在人體內之吸收與有效率是與藥物粒子大小有關，一般溶液比小粒懸濁液體，在吸收上更快速，作用更確實，其在身體內之血中濃度極高，因此使用藥量得以減少而效果不變，更可避免意外之副作用，本劑是依據此原理，精選各種有效成分配合而成，以發揮不同作用點之相乘效果。

本劑配伍祛痰劑—Guaiacol Glycerine Ether，支氣管擴張劑—DL-methylephedrine HCl以及抗組織胺劑之Chlorpheniramine maleate製成完全溶解之液劑，故服用後在吸收上快速，作用確實，並可使藥效發揮相乘之綜合治療效果。

組 成 : Each 20ml contains :

Methoxyphenamine Hydrochloride .....	20mg
Guaiacol Glycerine Ether .....	50mg
DL-Methylephedrine Hydrochloride .....	25mg
Chlorpheniramine Maleate.....	4mg
Dihydroxypropyl Theophylline .....	50mg
Caffeine Hydrate .....	50mg

賦 形 劑 : Taurine、Sucrose、Strawberry Essence、Ethanol。

適 應 症 : 紓解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、喀痰、咳嗽)。

用法用量 : 通常成人每次20ml, 12~15歲10ml, 11歲以下小孩酌減份量，一日二次服用，醫師藥師藥劑生指示藥品。

副 作 用 : 1.偶有過敏反應。

2.在建議劑量下使用少有副作用發生。

3.長期服用超大劑量會引起肝毒性，在兒童急性中毒劑量小於150mg/Kg。

4.嗜睡、口乾、倦怠感、視覺模糊、錯亂、小便困難、心跳加快。

5.神經質、興奮、睡不著與心搏加快。

6.暈眩、神經質、躁動、顫抖、呼吸困難、虛弱、臉色蒼白。

警 語 : 1.服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加快、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。

2.除非藥師、藥劑生或醫師指示，3歲以下不建議自行使用。

3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，曾經因藥物引起過敏症狀者不得服用。

4.若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、腹痛、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。

5.吸煙、慢性阻塞性肺疾，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本類藥品。

6.服用本類藥品後，駕車或操作危險機械時要小心。

7.除非有藥師、藥劑生、或醫師指示，下列病患請勿服用本類藥品：青光眼、肺氣腫、呼吸困難，因前列腺腫大引起之排尿困難等。

8.不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。

9.不要服用本類藥品超過七天。

10.服用本類藥品後如果症狀沒有改善，或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三天，應停藥立即就醫。

11.服用本類藥品後，如果喉嚨疼痛持續二天以上並併有發燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。

12.服用本類製劑應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

13.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，有心臟病或高齡者不得服用本類製劑。

14.含咖啡因之本類製劑，12歲以下之患者不得服用。

注意事項 : 1.須置於小孩接觸不到之處。  
2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。  
3.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。  
4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。  
5.使用前須搖勻，並使用廠商所附量器量取藥量。  
6.除非藥師、藥劑生或醫師指示，服用本類藥品時不得併服其他藥品。  
7.不得併服含酒精飲料。  
8.苯酮尿症(Phenylketonuria)患者不得服用本類藥品。

久松化學企業股份有限公司

彰化縣秀水鄉彰水路一段340號