

“內外” 培 胃 得 錠

Pithate Tablets “N.W.”

醫師藥師藥劑生指示藥品

本劑採用對伴有胃腸神經症狀之慢性胃腸疾患特有療效之Pipethanate HCl，配合強力而安定之制酸劑Magnesium Aluminumdisilicate、Magnesium Carbonate及能助潰瘍面肉芽發生之Copper Chlorophyllin Sodium等，促進潰瘍之治療，再配合以Glycyrrhiza Extract之抗組織胺性、出血性、網內皮系賦活作用，如此相成作用，而對胃腸疾患，潰瘍等具有卓著效果。

【作用】

1. 本劑配有抗緊張，抗不安的Pipethanate HCl可改善負荷引起的不安，其末梢作用具有類Atropine作用及Papaverin樣作用，可緩解胃腸緊張，抑制胃液分泌，對於急性胃腸炎、胃腸神經症，具有確實療效。
2. 本劑中含強力而安定之制酸劑Magnesium Aluminumdisilicate及Magnesium Carbonate，對潰瘍、胃酸過多能消除，抑制胃酸分泌，能迅速治療。
3. 胃腸病引起之口臭、呼吸惡臭、吐臭等，本劑中之Copper Chlorophyllin Sodium能祛除其臭味，且能助潰瘍面肉芽發生。
4. Glycyrrhiza Extract具有抗組織胺性、出血性、網內皮系賦活作用，對消化性潰瘍具有療效。

【成分】Each Tablet contains:

Pipethanate HCl.....	1.5 mg
Copper Chlorophyllin Sodium.....	0.5 mg
Aminoacetic Acid.....	10 mg
Magnesium Carbonate.....	10.5 mg
Magnesium Aluminumdisilicate.....	147.5 mg
Glycyrrhiza Extract.....	35 mg

【適應症】伴有胃腸神經症狀之慢性胃腸疾患、十二指腸潰瘍、急慢性胃炎、噁心、嘔吐、胃潰瘍。

【用法用量】

成人一日服用3~4次，每次2錠。

【注意事項】

腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis Encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

【包裝】16~1000錠塑膠瓶裝。

【貯存】請於25°C以下保存，並放置在孩童無法取得處。



內外化學工業股份有限公司

雲林縣斗六市斗六工業區復興路 3 號