外用

萬吉 軟膏

Fungin Ointment "Standard"

萬吉軟膏為強力殺黴菌軟膏，可迅速止癢，效果優異。

成　分：每gm含：

Undecylenic acid.....50mg

Triacetin.....150mg

Triethanolamine.....20mg

適 應 症：

治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬（香港腳）、股癬。

用法用量：

通常每日早晚各使用一次，將本品均勻塗佈於患部及其周圍即可。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項：

1.須置於小孩接觸不到之處。

2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

5.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得使用於眼睛四周或黏膜。

6.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。

7.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。

8.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。

9.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。

10.深部皮膚組織感染請就醫治療。

11.黴菌治療至少二星期，使用此藥須完成全程療程。

12.一般黴菌治療一星期症狀會改善，股癬和體癬經二星期，足癬經四星期治療，症狀若沒有改善應停藥立即就醫，即使若症狀有改善停藥後若病情復發，應停藥立即就醫。

副 作 用：

1.局部皮膚刺激及灼熱感。

2.過敏性皮膚炎。

3.紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。

警　語：

對藥物各成分過敏者不得使用。

賦形劑：

Triethanolamine、Polyethyleneglycol 400、Polyethyleneglycol 4000、Lavender Oil、Rose Oil

包　裝：

10、100克管裝；500克罐裝。

衛署藥製字第007280號 Code No.OF-01 3216050

PIC/S GMP藥廠
生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區土庫里土庫6之20號

S0408