

"生達" 灰黃黴素 錠 Griseofulvin Tablets

黴菌性皮膚，治療過程上常感困難，因病菌深藏於皮膚角質層內，外用藥物不能進入，無法徹底清除病菌，因此這類皮膚病時常復發，甚至可能會愈治愈惡化，遂使人誤認為香港腳、灰指甲及其他皮膚頑癬等是無法根治的疾病。

合成之抗黴菌抗生素Griseofulvin為這類皮膚疾病之口服特效藥。

成 分：每錠含

Griseofulvin.....125mg

適應症：甲癬(Onychomycosis)、髮癬(Tinea Capitis)，不適宜局部外用治療或局部外用無效的皮膚黴菌感染。

作 用：Griseofulvin口服後在腸內被吸收，由血液送至皮膚，進入角質形成細胞，當角蛋白變成角質時，Griseofulvin分子即滲入其間組成堅強的抵抗層，防止病菌侵入，隨著皮膚的代謝，抵抗層逐步向外推展，含菌組織慢慢脫落，病部便漸漸治癒，其作用專一。

用法用量：

通常成人每日3~4錠，兒童每日1~3錠，治療時間以病情和部位而定，普通約2~5星期症狀完全消退後須繼續服用1~2星期，香港腳和皮膚癬，服藥後1~2日，即可止癢，數日內可看到健康皮膚生長，如兩三星期後，症狀未有改善，即可能診斷錯誤。本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

1. 禁 忌：

- a. 紫質病的患者。
- b. 肝障害的患者。
- c. 對本劑曾有過敏症的患者。

2. 慎重投與：

全身性紅斑性狼瘡(SLE)或者帶有SLE誘因之患者(因恐怕會誘發或增惡SLE)。

3. 副作用：

- a. 過敏症：偶有過敏症及血管神經性浮腫，光線過敏症出現，如有此現象就要中止投與。
 - b. 皮膚：偶會出現發疹、紅斑、蕁麻疹、剝脫性皮膚炎、色素沈著等症狀。
 - c. 血液：偶有白血球減少，顆粒球減少等的症狀出現。
 - d. 肝臟：會出現GOT的上昇，BSP排泄延遲等。
 - e. 消化器：會有食慾不振、噁心、嘔吐、下痢、心窩部痛及偶而會出現味覺異常、舌痛、口渴等症狀出現。
 - f. 精神神經系：會有眩暈、頭痛、頭重、嗜睡、不眠、及偶而會出現耳鳴、精神錯亂、抑鬱狀態、視力障害、末梢神經炎等症狀。
 - g. 腎臟：有時會出現蛋白尿等症狀。
 - h. 代謝異常：偶而會出現紫質病。
 - i. 其他：有時會有倦怠感、發熱、關節痛及偶而會出現女性型乳房。
- 4. 對妊婦的投與：**從動物實驗中被報告有催畸形作用，所以妊婦或妊娠可能的人，除非是治療上的有益性大於危險性時才能給予投與。
- 5. 相互作用：**
- a. 本劑能增強乙醇的作用、且又可把Warfarin系抗凝血劑的作用減弱，所以和這些併用時對於用量要注意。
 - b. 和Barbiturates酸誘導體併用時會減低本劑的作用，所以併用時對於用量要注意。

6.其他：

- a.長期投與時希望能施行定期的肝機能、腎機能、血液等的檢查。
- b.本劑投與中會有附著皮膚絲狀菌的角質層漸漸脫落的現象，因此需併用適當的局部治療。

7.室溫保存：有效期間3年

賦形劑：Starch , Lactose , Sodium Starch Glycolate , Magnesium Stearate , Water Purified

包裝：6~1000錠盒、瓶裝。

衛署藥製字第007372號 Code No. TG-03 2211410



PIC/S GMP藥廠

生達化學製藥股份有限公司

STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

台南市新營區土庫里土庫6之20號