

“黃氏”

感冒友膠囊

Kanmauyu Capsules "H.S."

1. 本藥不含比林系藥品成分，對此類藥品過敏的人可以安心使用。
2. 本藥具有解熱、鎮痛、鎮咳以及祛痰等作用，可以緩解感冒引起的不舒服症狀。
3. 本藥成分以及作用如下：

成 分	作 用
Acetaminophen、Ethoxybenzamide	可以緩解感冒引起發熱以及頭痛等症狀。
Dextromethorphan Hydrobromide	止咳。
DL-methylephedrine hydrochloride	具有支氣管擴張效果，而可緩解咳嗽。
Chlorpheniramine Meleate	緩解感冒引起的鼻塞、流鼻水症狀。

【成分】

有效成分及含量：Each capsule contains：

Caffeine Anhydrous.....25mg
 Acetaminophen.....200mg
 Dextromethorphan Hydrobromide.....10mg
 DL-Methylephedrine Hydrochloride.....8mg
 Ethoxybenzamide.....166mg
 Chlorpheniramine Maleate.....2.5mg

其他成分(賦形劑)：Starch。

膠囊成分：Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、Purified Water、Titanium Dioxide、Tartrazine。

【用途(適應症)】緩解感冒之各種症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咳嗽、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

- (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- (二) 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(SSRI)的人。
- (三) 有蠶豆症的人。
- (四) 懷孕28週以上的婦女。

(五) 18歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除，因其可以引發罕見但嚴重的雷氏症候群。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- (一) 12歲以下。
- (二) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
- (三) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
- (四) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
- (五) 有心臟病及65歲以上的人。
- (六) 有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
- (三) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
- (四) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- (五) 曾有消化性潰瘍的人。

四、其他使用上注意事項：

- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二) 避免陽光直射。
- (三) 勿超過建議使用量。
- (四) 不要服用本藥超過七日。
- (五) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
- (六) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。
- (七) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
- (八) 不得與酒精性飲料併用。
- (九) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

一次一粒，一日服用三次，飯後 30 分鐘服用。

年齡	每次使用劑量
成人及 18 歲以上	一粒
14 歲以上未滿 18 歲	半粒

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- (三) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- (四) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- (五) 服用過量【每日超過 Acetaminophen 4,000 毫克(mg)】，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (六) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】 100、500 粒盒裝。100、500、1000 粒瓶裝。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存條件】 25°C 以下儲存。