

衛署藥製字第00815號

來舒胃錠

My-Gel Tablets

Each tablet contains :

【主成分】：Aluminum Hydroxide Dried Gel.....200 mg
Magnesium Hydroxide.....200 mg
Dimethicone.....20 mg

【賦形劑】：Lactose、Menthol、Magnesium Stearate、Potato Starch、Purified Water

【作用】：本品為氫氧化鋁與氫氧化鎂之複合製劑，具有制酸作用，口服後產生中和胃酸作用，因而形成膠狀，能均勻散於胃壁，形成廣大吸著面中和多量的胃酸。

【特性】：1.本劑主成份使胃液維持於適當的pH範圍內(pH=5)不受胃液pepsin影響。

2.具制酸能力。

3.不引起反跳性胃酸分泌過多。

【適應症】：緩解胃部不適或灼熱感，或經診斷為胃及十二指腸潰瘍，胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、解除脹氣，緩解氣脹相關症狀。

【用法用量】：一日3次，飯後1小時或需要時服用，應嚼碎後吞服。

成人每次2錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，每次1錠；

3歲以上未滿6歲，每次1/2錠；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

單次劑量(2錠)之酸中和能力為10.0mEq, 鎂含量為13.8mEq》

【注意事項】：

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警語】：

- 1.除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (1)對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。
 - (2)未滿3個月之嬰兒不得服用。
 - (3)一天內不可服用超過每日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
 - (4)本藥不得併用其他藥品。
- 2.如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- 3.消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
- 4.本藥含鋁之制酸成分：
 - (1)可能會引起便祕，偶有噁心、嘔吐。
 - (2)腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。
- 5.本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。

【包裝】：12-1000錠塑膠瓶裝。

【貯存】：25°C以下。



美西製藥有限公司
高雄市仁武區工業一路九號

