副交感神經遮斷劑　衛署藥製字第008896號
Code No. 30105

"溫士頓"

穩治寧　錠

"Winston"

Wintyl　Tablets

本品主成分Dicyclomine Hydrochloride 係屬副交感神經抑制劑能競爭性的遮斷副交感神經末稍之Acetylcholine，緩解平滑肌痙攣，解除由胃腸道炎、胆管炎、輸尿管炎等所引起之痙攣性疼痛。另合理配合Phenobarbital，輔助主成分的藥理作用。

【成分】本品每錠中含:

Dicyclomine hydrochloride.....20mg
Phenobarbital.....15mg

【作用及特徵】

(1)鎮痙、鎮痛作用:
Dicyclomine Hydrochloride具有Atropine之作用，能直接抑制副交感神經，且有如Papaverine之作用，直接作用於平滑肌，弛緩平滑肌運動過度所致之疼痛。Phenobarbital具高度的抗痙攣及適度的中樞鎮靜作用。此二成分經合理配合，發揮相乘的療效。

(2)無類似Atropine及Belladonna之副作用:
在治療劑量下，殆無使用Atropine時所常見之口渴、瞳孔放大、心悸亢進等副作用，故對於患有綠內障、心臟病等之病人，亦可安心服用。

(3)毒性極少無積蓄作用:
Dicyclomine Hydrochloride 之毒性極少。經口投與時LD_{50}=625±21mg/kg。在體內作用後，大部份(85%以上)在體內分解，並迅速從尿中排泄、故無積蓄作用。

【適應症】
胃腸道機能障礙所致之痙攣疼痛、痙攣性便秘、結腸炎、初期痛經、胆道機能障礙、輸尿管痙攣等平滑肌痙攣疼痛症。

【用法用量】
通常成人每天三~四次，每次一錠，飯後或飯前、睡前服用。可依症狀輕重斟酌量增減，本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】
1.可能會有口乾、眩暈、疲倦、噁心、頭痛、疹、小便困難等輕度副作用發生。
2.Phenobarbital長期使用會引起習慣性。

【包裝儲存】
6~1000錠塑膠瓶、PTP鋁箔裝。
25℃以下儲存。

1504-01

溫士頓醫藥股份有限公司
台南市永康區仁愛街117號