制酸、解痙劑

EST-001
衛署藥製字第08915號

YSP

胃必新 錠

Episin® Tablets

胃爲人體消化食物、吸收營養以產生能量之重要器官、其機能之正常與否直接影響人之健康，永信胃必新錠綜合了解痙、制酸劑、胃壁保護劑、界面活性劑、潰瘍面肉芽增生劑及芳香健胃劑，使用本藥若同時能配合情緒的平靜、規律的生活、清淡的飲食，則必可有事半倍之效。

【成　　分】每錠中含：

Homatropine Methylbromide	2mg
Aluminum Magnesium Hydrate	400mg
Magnesium Trisilicate	300mg
Sodium Lauryl Sulfate	10mg
Sodium Carboxymethylcellulose	22.5mg
Glycyrrhizin	5mg
Menthol	2mg

【賦　形　劑】

Carboxymethylcellulose Sodium、Sodium Lauryl Sulfate、Menthol、Mannitol、Potato Starch、Calcium Carboxymethylcellulose、Cinnamon Oil、Polyethylene Glycol 6000、Sodium Glycyrrhizine、Sodium Saccharin、Magnesium Stearate。

【作　　用】

1. Homatropine Methylbromide係一類似Atropine之藥物，其4級銨的構造能治療胃腸道痙攣現象，而達到解痙、鎮痛效果。
2. Aluminum Magnesium Hydrate能迅速將過多的胃酸中和，持續維持胃液之理想酸鹼值，而Magnesium Trisilicate在胃中分解後之silicon能在粘膜潰瘍處形成保護膜，適用於消化性潰瘍之治療。
3. Sodium Lauryl Sulfate係一界面活性劑，除能促進其他主成分之均勻分佈於胃粘膜外，又可與Sodium Carboxymethylcellulose形成保護薄膜，以緩和過多的胃酸刺激。
4. Glycyrrhizin係一生藥成分，能促進潰瘍面的肉芽增生作用。併以Menthol可應用於清涼及健胃用途。

【適　應　症】

緩解胃部不適或灼熱感、胃酸過多、消化不良。

【用法．用量】

通常成人一次服用1～2錠，一日服用3～4次。
6歲以上未滿12歲：爲成人劑量之1/2。
3歲以上未滿6歲：爲成人劑量之1/4。
3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【警　　語】

一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
1. 未滿3個月之嬰兒不得服用。
2. 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
3. 制酸劑不得併用其他藥品。
二、有高血壓、心臟病、腎疾患、腹水、水腫之患者禁用本藥。
三、本藥應嚼碎後吞服。
四、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
五、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
六、腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

【注 意 事 項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【副　作　用】

本藥耐受性良好，針對某些患者偶有腹瀉、便秘、噁心、嘔吐及胃部不快感等現象。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【給消化系統異常患者的治療建議】

1. 少吃刺激性食物或飲料，如辛辣製品、酒精、咖啡、茶等。
2. 調整正常生活作息，減少過多的精神壓力。
3. 多攝取蔬菜與水果，補充足夠的纖維量以避免消化不良及便秘情形。
4. 避免不必要的藥物投與，如消炎鎮痛劑，以減少其對消化道的刺激。
5. 遵從醫師藥師藥劑生指示，按時正確服藥。

【包　　裝】

6～1000錠PTP鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

★如果您對本產品在使用上有任何的疑問，請逕洽產品諮詢專線0800-012-679，本公司專業藥師將竭誠為您服務。

YUNGSHIN®
永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電　　話：（04）26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2140837