衛署藥製字第009390號

惠普碘藥水

Povidone-Iodine Solution

本公司經多年潛心研究，特採用由Iodine與Polyvinyl-Pyrrolidone(P.V.P.)化學結合成的複合物(Complex)，調製成--無痛性碘酒(Povidone-Iodine Solution)，充分地發揮無機碘的消毒、殺菌效果，既不刺激組織產生疼痛，同時由於與 P.V.P.的化學結合(Chemical combination)，使碘有效地保留其消毒、殺菌力，其稀釋液不會產生沉澱也是一大特點。

【成分】有效成分及含量，每ml中含有：

Povidone-Iodine.....100mg

(eq.to Available Iodine.....10mg)

其他成分(賦形劑)：Purified Water

【用途(適應症)】緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等導致皮外之傷口及傷口周圍的洗淨、消毒、殺菌來防止傷口的感染。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

曾因本藥成分引起過敏。

二、有下列情形者，請洽醫師診治：

(一)3歲以下。

(二)有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議使用量或使用次數。

(四)使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。

(五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

(六)本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。

(七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

(八)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

(九)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

(十)勿接近火源。

(十一)有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及哺乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。

(十二)會使皮膚或衣物染色。

【用法用量】

一日數次	塗抹(撒佈或噴灑)於患部，或以紗布、脫脂棉等沾取塗抹

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有上述外之其他不適情況產生。

(二)使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

(三)使用後出現蕁麻疹、浮腫、胸悶等症況，及臉色蒼白、手腳冰冷、冒冷汗、呼吸困難等現象。

【包　　裝】4000毫升以下塑膠瓶裝

【儲存條件】25°C以下

【類　　別】醫師藥師藥劑生指示藥品

美西製藥有限公司
PIC/S GMP 高雄市仁武區仁武里工業一路9號