綜合感冒內服顆粒製劑

“富生”感 冒 顆 粒

Anticold Granules “F.S.”

衛署藥製字第 009960 號

c.G.M.P.

【成　　份】：每公克含有：

Acetaminophen	125 mg
Chlorpheniramine maleate	1 mg
Hesperidine	5 mg
Caffeine anhydrous	10.25 mg

【適 應 症】：緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)

【用法用量】：一日 3 次，飯後服用。

成人每次 4gm，12 歲以上，適用成人劑量。

本產品添附之量匙，每一平匙為“富生”感冒顆粒 2 公克。

※醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】：

一、 為防止兒童誤食請妥善保管。

二、 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

三、 除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：

(一)孕婦及授乳婦不建議自行使用。

(二)服用本藥時不得併服其他藥品。

四、 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

五、 不得併服含酒精飲料。

【警　　語】：

一、 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。

二、 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

(一)12 歲以下不建議自行使用。

(二)曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。

三、 患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。

四、 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。

五、 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。

六、 吸菸、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。

七、 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。

八、 不要服用本藥超過七日。

九、 服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。

十、 服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。

十一、酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為 Acetaminophen (Paracetamol)可能造成肝損害。

十二、本藥含抗組織胺類成份，應注意下列事項：

(一)服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要合併飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。

(二)除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。

十三、本藥含咖啡因類成份，應注意下列事項：

(一)應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張、興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

(二)為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

(三)12 歲以下兒童不建議使用。

【包　　裝】：24~1000g 塑膠瓶裝　　F.S.-G-001

【儲存條件】：30℃ 以下

富生化學製藥股份有限公司
台中市工業區 23 路 19 號
TEL:(04) 23590538