


## 抗甲狀腺劑

## “順華” 甲美樂 糖衣錠

## THIMAZOL S.C. Tablets “S.H.”

甲美樂(Thimazol) 係一作用較一般 Thiouracils 劑為強，藥效更迅速的抗甲狀腺劑，其化學名為：1-Methylimidazole-2-thiol。通常為白色～淺黃色結晶性粉末，易溶於水及酒精。



1-Methylimidazole-2-thiol

## 【作用·特長】

- 能迅速有效阻害甲狀腺組織內無機碘之有機化，減少 Diiodotyrosine 及 thyrosine 之合成，抑制甲狀腺荷爾蒙之產生，使亢進之基礎代謝 (Basal metabolism) 趨於正常化。
- 藥效優異，其效力約為 Thiouracil 之 100 倍，Propylthiouracil 之 10~15 倍。
- 自胃腸道吸收迅速，但不易蓄積體內，於 24 小時內，可完全自尿中排泄。
- 與維他命乙<sub>1</sub>，及 Glucuronolactone 併用時，效果更形彰著。
- Glucuronolactone 之同時使用，能充分促進肝機能以顯著增進本劑之抗甲狀腺作用，並改善甲狀腺機能。

## 【主成分】

每錠含：

Methimazole.....5mg

## 【賦形劑】

Avicel 101 (Microcrystalline cellulose)、Sucrose、Povidone、Gelatin、Hydroxy Propyl Methyl Cellulose、Magnesium Stearate、Corn Starch、Calcium Phosphate Dibasic Hydrated、Carnauba Wax Powder、Lactose、Titanium Dioxide

## 【適應症】

甲狀腺機能亢進、甲狀腺手術前後。

## 【用法·用量】

成人每次 1~2 錠，每日三次服用，效果呈現後，維持劑量為每天 1~2 錠，小孩 10~15 歲劑量為成人之 2/3，5~10 歲劑量為成人之 1/3~1/2。本藥須由醫師處方使用。

## 【警語】

- 本藥品有引起顆粒性白血球減少症之副作用，若使用後有發燒與喉嚨痛的症狀，請即刻停止服藥且與醫師聯繫，確定是否有此類不良反應之發生。
- 使用本藥品有引起肝炎之副作用，若有食慾不振、疲倦、噁心、嘔吐等反應時，請與醫師聯繫作進一步診斷。

## 【注意事項】

- 本品可致顆粒性白血球缺乏症及甲狀腺增生過速症，尚有皮疹、蕁麻疹及關節病等副作用。
- 服用 Methimazole 應嚴密監視，如有任何明顯不適，特別是喉嚨痛、皮膚發疹、發燒、頭痛或是一般性的不適，應立即向醫師提出報告；白血球量差異檢測將用來確定顆粒白血球缺乏症是否已產生，尤其是病人另外服用引起顆粒性白血球缺乏症的藥物。
- Methimazole 會引起血內凝血酵素原過少及流血現象，使用期間必須檢測凝血時間，尤其是手術前。
- 本品有肝臟毒性，對於嚴重的肝臟反應要特別注意，如有臨床上明顯的肝異常症狀，包括 transamine value 三倍正常的上限值，應停止本藥物的治療。
- 懷孕婦女服用 Methimazole 會引起胎兒的傷害，此種藥物容易通過胎盤障壁，因此可能使正在發育中的胎兒產生甲狀腺腫和呆小症。
- 懷孕期間使用最小的有效劑量，且儘可能於分娩前 2~3 週停藥；服用 Methimazole 的母親不應餵乳給嬰兒。

## 【禁忌】

- 對本藥有過敏者。
- 授乳的母親，由於本藥會分泌到乳汁中。

## 【交互作用】

Methimazole 會加大抗凝血劑的作用，是由於抗 Vitamin-K 活性之故。

## 【副作用】

- 骨髓細胞製成的抑制作用
- 皮膚疹、蕁麻疹
- 顆粒性白血球減少症
- 肝功能異常
- 噁心
- 嘔吐
- 神經炎

## 【包裝】

100'S, 500'S, 1000'S (瓶裝)

## 【儲存條件】

25°C 以下，請緊閉避光儲存。