

感冒：鎮痛、解熱、祛痰劑
“新功” **速感能** 感冒液

SUCOMLON COLD solution “N.K.”

衛署藥製字第 010758 號

〔概說〕本劑係採用非比林系新型解熱鎮痛劑 Acetaminophen 為主要成分。不產生粒狀白血球之減少、藥物疹及肝臟障礙等之副作用，並配有咳嗽祛痰劑 Guaiacol Glyceryl Ether、支氣管擴張劑 dl-Methylephedrine HCl 以及抗組織胺中效力強而副作用較少之 Chlorpheniramine Maleate 製成完全溶解之透明劑型-糖漿劑，故服用後在吸收上更快速，作用更確實，並更可使藥效發揮相乘之綜合治療效果。

〔成分〕 Each mL contains

Acetaminophen.....	5mg
Chlorpheniramine Maleate.....	0.04mg
Dextromethorphan HBr.....	0.25mg
dl-Methylephedrine HCl.....	0.15mg
Guaiacol Glyceryl Ether.....	1.33mg

〔適應症〕

感冒諸症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咳嗽、喀痰、咽喉痛、發熱、頭痛)之緩解。

〔用法用量〕

通常成人一次 10mL，15~11 歲 6.5mL、11~8 歲 5mL、8~5 歲 3.5mL、5~3 歲 2.5mL、3~2 歲 2mL，1 日 3 次飯後服用必要時就寢前服用一次。

本藥須經醫師指示使用。

注意事項：

1. 本劑含有劇藥應切實按照所定方法及劑量使用。
2. 在就診中尚使用其他解熱鎮痛或感冒藥劑者，應避免重複使用。
3. 應用本劑數次未見症狀改善時，應即停用。
4. 避免長期服用。
5. 本劑應置於小孩伸手不及處。

(一) 肝毒性：

1. 使用 acetaminophen (paracetamol) 曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部分發生肝臟損害之病例係因使用超過每日 4,000 毫克的 acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 acetaminophen 成分之藥品。
2. 過量服用 acetaminophen 可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有 acetaminophen 成分之藥品，因而造成用藥過量。
3. 有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用 acetaminophen 期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有 acetaminophen 或 paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過 4,000 毫克的 acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

- (二) 與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為 acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 acetaminophen 而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。
- (三) 過量：
1. 服用過量 acetaminophen 會在服藥 24 小時內看到初期症狀，可能包括：腸胃道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
 2. 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
 3. Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後 48~72 小時才明顯可見。
- (四) 過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用 acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對 acetaminophen 過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成份之藥品。
- (五) 嚴重皮膚反應：使用 acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿皰病 (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文生氏-強生症候群 (Stevens-Johnson Syndrome, SJS) 和毒性表皮壞死溶解症 (Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

[包裝] 10~4000 公撮瓶裝。

委託者：新功藥品工業有限公司
台南市新營區同濟街 87 號
(06)6322718

製造廠：龍杏生技製藥股份有限公司
台南市佳里區嘉福里 115-1 號
(06)7220666