

仿單標籤粘貼表

產品名稱	"派頓"弛刻達膠囊	申請廠商	臺灣派頓化學製藥股份有限公司
衛生福利部食品藥物管理署給證號碼	衛署藥製字第011012號		

PIC/S GMP藥廠
衛署藥製字第011012號

"派頓"

弛刻達 膠囊

SKETA

CAPSULES "PATRON"

【成分】：每膠囊中含有：

Chlorzoxazone-----250mg

Acetaminophen-----300mg

【賦形劑】：Magnesium stearate.

#0 Blue-Yellow No.Patron 610 Capsules: Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Purified Water, Brilliant Blue FCF, Titanium Dioxide, Tartrazine.

【作用及特長】：

(1)Chlorzoxazone是一種肌肉弛緩劑，其作用點在脊椎和腦下皮層，它對產生骨骼肌痙攣的多神經節反射弧，具有抑制作用而使肌肉放鬆。

(2)Acetaminophen是一非柳酸鹽類之鎮痛劑，對於骨骼肌的疼痛症，有優良的療效，且藥效持久，鮮少副作用。

【適應症】：

關節痛、肌肉痛、顏面神經痙攣、神經痛、肌肉之痙攣強直及疼痛、肩酸、運動後之酸痛。

【用法用量】：

通常1次1粒，限1日3次，盡量避免空腹時使用，服用間隔為4小時以上。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

(1)禁忌：過敏症之既往患者。

(2)慎重投與：

a. 肝腎障害患者。

b. 懷孕中投與時其安全性尚未確立，孕婦或可能懷孕婦女需權衡治療上之有益性及危險性慎重投與。

(3)副作用：

a. 過敏症：發疹、瘙癢感等過敏症狀出現時，應即中止服用。

b. 思睡、眩暈、搖晃、倦怠等症狀出現時，應減量或休藥。

c. 會引起肝腎機能障害，應仔細觀察。

d. 偶有噁心、嘔吐、胸悶、食慾不振、腹瀉、便秘等症狀。

e. 偶有血小板減少症、顆粒狀減少症，需仔細觀察。

【警語】：

1、肝毒性：

(1)使用acetaminophen(paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4000毫克的acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含acetaminophen成分之藥品。

(2)過量服用acetaminophen可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了。

(3)有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用acetaminophen其他同樣含有acetaminophen成分之藥品，因而造成用藥過量。期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有acetaminophen或paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有acetaminophen成分之藥品。如果一天誤服超過4000毫克的acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

2、與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為acetaminophen可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能因過度使用acetaminophen而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

3、過量：

(1)服用過量acetaminophen會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。

(2)本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。

(3)Acetaminophen過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀，可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48~72小時才明顯可見。

4、過敏/過敏性反應：

上市後曾有發生與使用acetaminophen相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對acetaminophen過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

5、嚴重皮膚反應：使用acetaminophen的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告中，如急性全身發疹性膿疱病(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文生氏-強生症候群(Stevens Johnson Syndrome, SJS)和毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥品。

【包裝】：6~1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【儲存】：宜儲存於25℃以下。



臺灣派頓化學製藥股份有限公司
高雄市岡山區為隨東路50號 TEL: (07)6216126



※ 外文仿單應檢附中文譯文

仿單標籤粘貼表

產品名稱	"派頓"弛刻達膠囊	申請廠商	臺灣派頓化學製藥股份有限公司
衛生福利部食品藥物管理 署給證號碼	衛署藥製字 第 011012 號		



"派頓"
弛刻達 SKETA
膠囊/CAPSULES "PATRON"

10'Sx100A 膠囊

衛署藥製字第011012號

成份/Each capsule contains
Chlorzoxazone 250mg
Acetaminophen 300mg

適應症/
關節痛、肌肉痛、顏面神經痙攣、神經痛、肌肉之痙攣強直及疼痛、肩酸、運動後之酸痛。

用法用量/
通常 1 次 1 粒，限 1 日 3 次，盡量避免空腹時使用，服用間隔為4小時以上。
本藥須由醫師處方使用。

儲存/宜儲存於25°C以下。
注意事項：請詳閱說明書後使用。

批 號/

保存期限/




4 715045 301352



臺灣派頓化學製藥股份有限公司
高雄市岡山區為隨東路50號



"派頓"
弛刻達 SKETA
膠囊/CAPSULES "PATRON"

1000 膠囊

衛署藥製字第011012號

成份/Each capsule contains
Chlorzoxazone 250mg
Acetaminophen 300mg

適應症/
關節痛、肌肉痛、顏面神經痙攣、神經痛、肌肉之痙攣強直及疼痛、肩酸、運動後之酸痛。

用法用量/
通常 1 次 1 粒，限 1 日 3 次，盡量避免空腹時使用，服用間隔為4小時以上。
本藥須由醫師處方使用。

儲存/宜儲存於25°C以下。
注意事項：請詳閱說明書後使用。

批 號/


保存期限/




4 715045 301161



臺灣派頓化學製藥股份有限公司
高雄市岡山區為隨東路50號



※ 外文仿單