

“信東” 胺美樂瑞 注射液

Aminol-K Injection

許多研究報告發表，除非胺基酸量的，質的配合很適當，否則利用來組成蛋白質的利用率不會太高，因此合理的組成，乃決定胺基酸的營養價值的最大因素，1965年，世界衛生組織(WHO)及糧農組織(FAO)蛋白質需要量特別委員會特別推薦一最適合人類營養的胺基酸組成，其必須胺基酸及非必須胺基酸之比為1：1，以此一新發現為原則，本公司即著手研究而創製出本『胺美樂瑞』製劑，其處方乃依據人類血漿蛋白中之胺基酸組成型態，靜脈注射之特殊條件，並考慮病人營養及代謝障礙經重複多次實驗而決定者，包含有8種必須及9種非必須之綜合胺基酸配合克力醣(Xylitol)而成的輸液，因此本品乃胺基酸最合理配合、利用率最高，在生體內停留得時間最長的製劑。

《成 分》

Each mL contains :

L-isoleucine.....	1.89mg	L-arginine HCl.....	1.65mg
L-leucine.....	1.95mg	L-sodium aspartate.....	2.4mg
L-lysine HCl.....	3.3mg	L-sodium glutamate.....	3mg
L-methionine.....	1.41mg	L-histidine HCl.....	1.424mg
L-phenylalanine.....	1.95mg	L-proline.....	1.424mg
L-threonine.....	1.8mg	L-serine.....	1.5mg
L-tryptophan.....	0.45mg	L-tyrosine.....	0.046mg
L-valine.....	1.95mg	Glycine.....	2.356mg
L-alanine.....	1.5mg	Xylitol.....	.50mg
Total of essential amino acid.....	14.7mg		
Total of non-essential amino acid.....	15.3mg		
E / N ratio.....	0.96		
Total nitrogen.....	3.9166mg		
Na ⁺	0.04132meq / mL	Cl ⁻	0.03334meq/mL

本藥含賦形劑L-Cysteine、HCl、Sodium Bisulfite、Sodium Hydroxide、Water for Injection。

《特 長》

1. 新的胺基酸組成，與血漿蛋白組成相近。
2. 必須胺基酸與非必須胺基酸最合理之配合。
3. 配合克力醣(Xylitol)增加胺基酸之利用率。

《適 應 症》

手術前後之營養補給，不能經口之補給營養及水分時。

《用法·用量》

每次500~1,000ml，一天1次~2次，靜脈緩慢點滴注射。
依年齡、症狀增減之。
本藥限由醫師使用。

《注 意》

1. 注射速度不可太快，否則會引起嘔氣、嘔吐、或胸口不適，通常每分鐘以45~60滴之速度點滴之。
2. 開瓶後即刻使用，未用完之輸液應拋棄之。
3. 冷天時應將輸液溫至體溫後使用。
4. 貯藏於陰涼、避光、熱之處所。

《使用之注意事項》

(一)取用時：

1. 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。
2. 若藥液有不澄清、變色，異物或其他異常現象時，請勿使用。

(二)輸液套選用及插入法：

1. 請依輸液套使用方法正確使用。
2. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針刺(coring)產生碎片。
3. 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

《包 裝》

玻璃瓶：250ml，500ml，1000ml
衛署藥製字第011723號



信東生技股份有限公司
桃園市介壽路22號

54010100⑤