

綜合感冒劑
甜 風 寶 液
SWEET FONG POU SOLUTION

對於感冒症候群之解熱、鎮痛、鎮咳、祛痰有改善之功效。

【成 分】：每1ml中含：

Acetaminophen.....	10mg	Potassium Guaiacol Sulfonate.....	2.5mg
Chlorpheniramine Maleate.....	0.1mg	Caffeine.....	1.25mg
DL-Methylephedrine HCl.....	0.4mg		

【適 應 症】：緩解感冒之各種症狀（流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛）。

【用法用量】：一日4次。成人每次10ml，12歲以上適用成人劑量。

醫師藥師藥劑生指示藥品

【注意事項】：

- 1.為防止兒童誤食請妥善保管。
- 2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3.除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
(1)孕婦及授乳婦不建議自行使用。 (2)服用本藥時不得併服其他藥品。
- 4.勿超過建議劑量。若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 5.本藥使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
- 6.不得併服含酒精飲料。

【警 語】：

- 1.服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就藥。
- 2.除非醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
(1)3歲以下不建議自行使用。 (2)曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
- 3.若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
- 4.吸菸、慢性阻塞性肺疾，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
- 5.不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
- 6.不要服用本藥超過七日。
- 7.服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
- 8.服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
- 9.酒精警語：若每日喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問醫師是否能服本藥，因為Acetaminophen可能造成肝損害。
- 10.本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項：
(1)服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
(2)除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
- 11.本藥含支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。
- 12.本藥含咖啡因類成分，應限制再服用含咖啡因藥品、飲料（如：茶、咖啡、可樂等），過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。
- 13.為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。
- 14.12歲以下兒童不建議使用。

【包 裝】：10-4,000毫升玻璃瓶裝

衛署藥製字第011847號

儲存條件：（室溫15-30°C）儲存

製造廠 威力化學製藥股份有限公司

臺南市開元路60號

委託者 正統藥品工業股份有限公司

臺南市青年路132巷35號