綜合鎮咳祛痰劑　　衛署藥製字第11871號

舒舒-優糖漿

NoCough-U Syrup

Each ml contains :

【主 成 分】：Codeine Phosphate.....0.6mg
Potassium Guaiacolsulfonate 2.64mg
Promethazine HCl 0.3mg
Ipecac Fluid Extract.....0.0006ml

【賦 形 劑】：Dehydroacetate Sodium、Glycine、Brilliant Blue FCF、Sunset Yellow FCF、Sucrose、Ethanol、Strawberry、Propylene Glycol、Water

【特　　性】：本劑係以鎮咳效果最爲顯著之磷酸可待因，配合化痰祛痰劑，以及抗過敏性藥劑等調製而成之鎮咳糖漿，對於因呼吸道受感染以及過敏性刺激等所引起之各種不適症狀：如咳嗽、排痰困難、打噴嚏等效力迅速而持久。
Codeine Phosphate爲一般鎮咳劑中效果最爲確實其鎮咳之藥理作用屬中樞性，直接抑制可引起咳嗽之各種神經性反射作用。
Potassium Guaiacol Sulfonate可促進氣管粘液之分泌功能使痰液稀釋而容易排出達成祛痰之效果，因而減少刺激而利咳嗽之解除。
Promethazine Hydrochloride爲長期性抗過敏劑，對於常見於傷風感冒時之各種敏感性症狀，如鼻塞、打噴嚏、咳嗽、流鼻水等均有持久性抑制作用。
Ipecac Fluid Extract爲常用之祛痰劑普遍用於各種鎮咳祛痰劑之處方內，在各種複方之鎮咳祛劑中可收協力之效果。

【適 應 症】：鎮咳、祛痰。

【用法用量】：15歲以上每次10ml，11~15歲每次6.5ml，8~11歲每次5ml，5~8歲每次3.3ml，2~5歲每次2.5m，一日三次，飯後服用。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】：1.須置於小孩接觸不到之處。
2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
5.使用前應振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

【副 作 用】：輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。

【警　　語】：1.長期使用易致成癮。
2.吸煙、慢性阻塞性肺疾(Chronic Obstructive Pulmonary Disease，包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽患者請勿自行使用。
3.有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
4.(1)早產兒、1歲以下嬰兒及1~2歲幼兒，不建議使用；(2)2~12歲兒童，依年齡減量使用；(3)肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。

【包　　裝】：10~90毫升、3800毫升玻璃瓶裝。

PIC/S GMP
美西製藥有限公司
高雄市仁武區工業一路九號