

“信隆”那利敵新錠 500 毫克  
Nalidixic Acid Tablets 500mg “Shinlon”

- 【成分】 每錠含  
Nalidixic Acid.....500 mg
- 【作用】 ※ Nalidixic Acid 對革蘭氏陰性菌具有特異的抗菌作用，內服即能達到高血中濃度，對尿、膽汁中的移行也很良好  
※ 對其他化學療法劑具耐性的細菌有效，且沒有交叉耐性。  
※ 對細菌性赤痢及其他腸管感染症，1~2 日即能退熱，2.5~5 日即能停止排出細菌。  
※ 對革蘭氏陰性菌引起的尿路感染症具有高度的治癒率。
- 【主治效能】 革蘭氏陰性球菌，引起的感染症：尿路感染症、細菌性赤痢、腸炎。
- 【用法用量】 通常成人一次 1~2 錠，一日 3~4 次服用，小孩依年齡遞減之。

本藥須由醫師處方使用。

- 【注意事項】 1. 一個月以下嬰兒及懷孕三個月以內之孕婦不得使用本劑。  
2. 繼續使用本劑一至二星期以上應作定期血液及肝臟機能試驗。  
3. 糖尿病患者於服用本劑期間其檢驗尿糖時應採用試紙法，如 Clinistix Test-tape 等而不宜使用 Benedict、Fehling 或 Clinic test 等法，以避免錯誤，蓋因本品在內即部份變成醣胺基結合物 (Glucuronic-Conjugate) 排出體外，此時如使用還原法檢驗尿糖則易生錯誤之故。

【賦形劑清單】 Corn Starch、Gelatin、Magnesium Stearate、Microcrystalline Cellulose 101、Povidone(P.V.P.)、Sodium Lauryl Sulfate(SLS)、Starch Paste

【包裝】 100、500、1,000 錠塑膠瓶裝。

【儲存條件】 室溫 25°C 以下，避光貯存。

衛署藥製字第 13180 號



信隆藥品工業股份有限公司  
Shinlon Pharmaceutical Ind., Co., Ltd.  
台灣·台南市仁德區中正路三段 269 號