衛署藥製字第014121號

"安星"布朗信錠
BROMHEXINE TABLETS

【成 分】每錠含:

Bromhexine Hydrochloride ……8mg

【賦形劑】Lactose、Potato Starch、Magnesium Stearate。

【作 用】本劑可促進支氣管水分分泌，減低喀痰之粘度，使容易排出，減少咳嗽次數而使呼吸容易。

【適應症】祛痰及減少呼吸道粘膜分泌物的黏稠性。

【用法用量】一日3次。成人每次1錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12 歲，每次1/2錠；3歲以上未滿6歲，每次1/4錠；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治。

【類 別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

一. 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

二. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

三. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

四. 勿超過建議劑量。

五. 服藥後若有不適情況發生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

六. 本藥不得與含酒精飲料併服。

【警語】

一. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾患(包括如慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起之咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽病人請勿自行使用。

二. 若有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。

三. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用:

(一)3歲以下，請洽醫師診治。

(二)曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。

【警語及注意事項】

有極少數的報告指出，發生如:多形性紅斑(erythema multiforme)、史帝文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症(Stevens-Johnson syndrome＜SJS＞/toxic epidermal necrolysis＜TEN＞)、急性廣泛性發診性膿皰症(acutegeneralised exanthematous pustulosis＜AGEP＞)等嚴重皮膚損害，與使用祛痰劑，如含ambroxol或bromhexine成分藥品有時間關聯性，但這些案例通常與患者的潛在疾病及/或併用藥物有關。此外，在該等嚴重皮膚不良反應的早期階段，患者可能先出現類似流感的非專一性前兆症狀(如：發燒、身體感覺疼痛、鼻炎、咳嗽及喉嚨痛)。若受這些類似流感之非專一性前兆症狀的誤導，一開始可能會使用咳嗽及感冒藥來作症狀治療。因此，如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。

【不良反應】

免疫系統疾患：

罕見：過敏反應(hypersensitivity reactions)

頻率未知：過敏性反應(anaphylactic reactions)(包括：過敏性休克、血管性水腫、癢癢症)。

皮膚及皮下組織疾患：

罕見：皮疹、蕁麻疹。

頻率未知：嚴重皮膚不良反應(包括：多形性紅斑、史帝文生症-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿皰症)。

【包 裝】6~1000錠塑膠瓶裝。

【貯 存】請將本品於30℃以下貯存。

安星製藥股份有限公司

新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673號