

衛署藥製字第 014277 號
Code No. D38

鎮咳祛痰劑

嗽隨康 錠

Sauscon Tablets

【成分】

每錠中含：

Codeine Phosphate 5 mg

Terpin Hydrate 10 mg

賦形劑：Potato Starch、Lactose、Magnesium Stearate、Talc、Cellulose

Microcrystalline、Povidone、Sodium Chloride、Aspartame、

Starch Pregelatinized、Sodium Cyclamate、Sodium Saccharin、

Tartrazine、Grape Flavour、Allura Red AC

【適應症】

鎮咳、祛痰(支氣管炎、咽喉炎等所引起之咳嗽)。

【用法用量】

通常成人每次 1~2 錠，一日 3~4 次，兒童酌減。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】

1. 已知 CYP2D6 超級快速藥物代謝者 (ultra-rapid metabolizers)。

2. 哺乳婦女。

【注意事項及警語】

1. Codeine 會經由肝臟酵素 CYP2D6 代謝為活性成分 morphine。如果病人屬於快速代謝者 (extensive metabolizer) 或超級快速代謝者 (ultra-rapid metabolizer)，即使是在正常使用劑量，亦可能會發生鴉片中毒症狀，且可以於病人血液中檢測到比預期高之 morphine 成分。在亞洲族群，超級快速代謝者 (ultra-rapid metabolizer) 之盛行率為 1.2%~2%。一般鴉片中毒症狀包括意識混亂、異常嗜睡、癱軟、呼吸緩慢或微弱、瞳孔變小、噁心、嘔吐、便秘、食慾不振等，嚴重會導致呼吸抑制，甚至導致死亡。

2. 謹慎使用本品於未滿 12 歲兒童，因可能會增加發生嚴重不良反應之風險。經醫師專業評估臨床效益大於風險時，方可考慮使用，且應依年齡減量使用，並特別提醒病人及其照護者，如發生鴉片中毒之相關症狀，應立即停藥並就醫治療。

3. 不建議使用本品於 12 至 18 歲具呼吸功能不全之兒童，例如具有神經肌肉疾病、嚴重心臟或呼吸系統疾病、上呼吸道或肺部感染及多重創傷或大範圍外科手術等，因可能會增加發生嚴重不良反應之風險，倘經評估仍需使用，應特別提醒病人及其照護者，如發生鴉片中毒之相關症狀，應立即停藥並就醫治療。

4. 禁止產婦於哺乳期間使用本品，因可能對於受哺乳嬰兒造成鴉片中毒之風險。雖然在正常治療劑量下，母乳中僅存在極低濃度之 codeine 與其活性代謝物，不太會對嬰兒產生不良反應，但屬 CYP2D6 超級快速藥物代謝之哺乳婦女，母乳中可能會存在高濃度之活性代謝物，可能對於受哺乳嬰兒產生鴉片中毒症狀，例如異常嗜睡、癱軟、餓養困難、呼吸困難，嚴重可能會致死。因此，產婦如需用本品治療，應避免以用藥期間之母乳哺餵嬰兒。

5. 肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。

6. 長期使用易致成癮。

7. 腎上腺功能不全風險：曾有使用 opioid 類藥品發生腎上腺功能不全之通報案例，且多數案例為使用該類藥品超過一個月者。腎上腺功能不全可能以非特異性症狀表現，例如噁心、嘔吐、厭食、疲倦、虛弱、眩暈及低血壓等。如懷疑病人發生腎上腺功能不全，應儘速進行相關檢查，倘經確診為腎上腺功能不全，應停止使用原 opioid 成分藥品，並持續使用皮質類固醇類藥品進行治療，直到腎上腺功能復原。另可嘗試使用其他不同成分之 opioid 藥品，因曾有通報案件，於更換其他不同成分之 opioid 藥品後，未再出現腎上腺功能不全之情形。惟依目前現有資料，尚無法認定有特定 opioid 成分與腎上腺功能不全較有相關性。

8. 併用 benzodiazepine 類藥品或其他中樞神經系統抑制劑之風險：含 codeine 成分藥品併用 benzodiazepine 類藥品或其他中樞神經系統抑制劑 (如：肌肉鬆弛劑、全身麻醉劑、酒精)，可能會引起重度鎮靜 (profound sedation)、呼吸抑制、昏迷及死亡等風險，故除非無其他適當治療方式，方可考慮使用。倘同時處方 opioid 類止痛藥品及 benzodiazepine 成分藥品或其他中樞神經系統抑制劑，應使用最低有效劑量及最短治療期程。當對於正在使用 opioid 類止痛藥品之病人，新增處方 benzodiazepine 成分藥品或其他中樞神經系統抑制劑時，抑或針對正在使用 benzodiazepine 成分藥品或其他中樞神經系統抑制劑之病人，新增處方 opioid 類止痛藥品時，應使用較低之初始劑量，且依據病人臨床表現調整劑量，並嚴密監測病人相關不良反應之發生。此外，應特別提醒病人及護理人員注意呼吸抑制和鎮靜之風險，病人於用藥期間亦不宜駕駛或操作危險器械。另針對具有濫用藥物可能之病人，應警告病人切勿飲酒或使用不法濫用藥物，否則可能會有過量和致死之風險。

9. 本品含阿斯巴甜 (Aspartame)，苯酮尿症患者 (Phenylketonurics) 不宜使用。

【副作用】

(一) 雄性激素缺乏：曾有使用 opioid 類藥品發生雄性激素缺乏之通報案例，且多數案例為使用該藥品超過一個月者。

(二) 血清素症候群：曾有使用 opioid 類藥品併用血清素作用劑藥品 (serotonergic drugs) 發生危及生命之血清素症候群 (serotonin syndrome) 通報案例。

【貯存】

25°C 以下儲存。

【包裝】

6~1000 錠塑膠瓶裝。

1801-01

Made in Taiwan



溫士頓醫藥股份有限公司
台南市永康區鹽洲里仁愛街117號