驅蟲劑　　衛署藥製字第 014597 號

“派頓”匹南特錠

Pyrantel Tablets “Patron”

【成　分】：每錠中含有

Pyrantel pamoate-----360mg(eq to Pyrantel---------125.0mg)

【賦形劑】：Starch, Sunset Yellow FCF, Magnesium Stearate, Lactose.

【作　用】：

1.Pyrantel pamoate 對於蟯蟲皆有驅蟲作用。其作用機序是具有神經肌肉遮斷作用，使寄生蟲不能活動而隨腸管之蠕動而排出體外。

2.Pyrantel pamoate 難溶於水，故極少被吸收，對全部腸管內之寄生蟲，產生驅蟲作用，但是對宿主之毒性很低。

【適應症】：

驅除蟯蟲。

【用法用量】：

請依體重計算每次服用劑量，每次 10mg/kg(as Pyrantel)，每日劑量不可超過 1,000mg(as Pyrantel)(8 錠)，可與食物、牛奶或果汁混合服用。2 週後若症狀仍未解除，或再有感染時可再投與 1 次劑量。3 歲或 12 公斤以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品

【副 作 用】：

胃腸道：噁心、嘔吐、腹瀉、腹部痛性痙攣、厭食。

中樞神經：頭痛、暈眩、嗜眠。

【注意事項】

1. 須置於小孩接觸不到之處。

2、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警語】

一、除非有醫師藥師藥劑生指示，肝疾患者，不得服用。

二、家中如有一成員感染蟯蟲，則全家皆應治療。

三、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

(一)3 歲或 12 公斤以下不建議自行使用。

(二)曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。

四、本藥含 Pyrantel， 應注意下列事項：

可能會引起噁心、嘔吐、腹瀉、痙攣性腹痛、厭食等胃腸道症狀及頭痛、失眠、眩暈、嗜睡、興奮感增加、紅疹等現象。

【儲存條件】：25℃以下儲存。

【包裝】：1000 錠以下塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝

臺灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄市岡山區為隨東路 50 號