綜合感冒治療劑

咳嗽安你奇錠

ANIGI-COUGH TABLETS

【成分】Each Tablet Contains：

Bucetin……90mg
Caffeine Anhydrous…… 15mg
dl-Methylephedrine HCl…… 5mg
Thiamine Disulfide…… 2.5mg
Ethoxybenzamide…… 90mg
Chlorpheniramine Maleate…1.25mg
Guaiacol Glyceryl Ether…… 25mg
Riboflavin……1.25mg

【適應症】

緩解感冒之各種症狀（鼻塞、流鼻水、打噴嚏、喀痰、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛）。

【用法用量】

通常成人 1 次 2 錠，1 日 3 次，飯後 30 分鐘內服用，並依年齡、症狀酌予增減之。

【作用】Bucetin, Ethoxybenzamide 二者均為解熱、鎮痛劑。

解熱：對於正常之體溫並無影響，仍可保持熱之恒定，而對某些發燒之患者，(如傷風、感冒及風濕性關節炎)直接作用於體溫調整中樞——下視丘，於體熱之產生並不加以抑制，但其可經由增加周圍血管之血流及出汗之方式，使熱大量之散失，以達到體溫下降之效果。

鎮痛：能迅速抑制大腦興奮引起之痛覺，亦使中樞對疼痛之感覺遲鈍，即可升高人類由不同方法誘出疼痛之閾，而對 CNS 產生有選擇性的鎮痛作用。

(1) Bucetin 為 Phenacetin 之衍生物，其溶解度較 Phenacetin 大，而較易被吸收，鎮痛作用比 Phenacetin 強而毒性僅為 Phenacetin 之 1/3。

(2) Ethoxybenzamide 經 Hardy-Worff Goodell 法試驗證明鎮痛作用為 Salicylamide 之 2.3 倍與 Aminopyrin 類似，又解熱效果與 Aspirin 同，亦具抗 Hyalluronidase，抗滲出性作用，產生消炎的效果，且毒性比 Salicylamide 少無胃腸障害等副作用。

「咳嗽」安你奇錠中 Bucetin 及 Ethoxybenzamide 之配合於臨床上產生相乘之鎮痛現象，此外尚含有 Thiamine disulfide 可增強鎮痛效應，又含有抗組織胺劑 Chlorphenira- mine Maleate、中樞神經興奮劑 Caffine 、支氣管擴張劑 dl- Methylephedrine HCl 及祛痰劑 Guaiacol Glyceryl Ether，由於各成份間之相加相乘作用，並於降低藥品副作用之原則下，產生相輔相成之效果。

【副作用及注意事項】

凡含有非比林系之解熱鎮痛劑或感冒用藥應注意事項。(1)本劑含有劇藥應切實按照所定服用方法及劑量使用。(2)在就診中尚使用其他解熱、鎮痛或感冒藥劑者，避免重複使用。(3)應用本劑數次仍未見症狀改善時應即停用。(4)避免長期服用。(5)本劑應置於小孩伸手不及處。

【賦形劑】

Hydroxypropyl Methylcellulose、Lactose、Magnesium Stearate、Corn Starch、Talc、Food Color Yellow N.5

【參考文獻】

(1)The Extrapharmacopoeia 26th edition (2)New Drugs in Japan (3)The Pharmacological Basis of Therapeutics

【許可字號】衛署藥製字第 015053 號

醫師藥師藥劑生指示藥品 | 電腦代號 DTP51

國際標準 PIC/S GMP 合格藥廠
回春堂製藥廠股份有限公司
台灣·桃園廠 桃園市新屋區社子里二鄰社子八號